

第1章 认识化学科学

第2节 研究物质性质的方法和程序

★教材 P21【练习与活动】

1. (1) B

(2) 钠与空气中的 H_2O 和 O_2 都可以反应, 钠和煤油不发生反应, 且钠的密度大于煤油的密度, 保存在煤油中可以隔绝空气

【解析】(1) 钠硬度小, 可以用小刀切割, A 错误; 钠的熔点比较低, 加热时先熔化, 再燃烧, 燃烧时产生黄色火焰, 最后生成 Na_2O_2 , B 正确, C、D 错误。

2. (1) B (2) $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{NaClO} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

【解析】(1) 通常情况下, 氯气呈黄绿色, 是一种有强烈刺激性气味的有毒气体, 易液化, 能溶于水(比例约为 1:2), A、C、D 正确。液氯与氯气状态不同, 但成分相同, 是同种物质, 而氯水是混合物, 其中含氯气、水、氯化氢、次氯酸等多种物质, B 错误。

(2) 84 消毒液的有效成分是 NaClO , 制取原理: $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{NaClO} + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ 。

3. 观察法、实验法、比较法

【解析】为了研究钠的性质, 该小组同学做了钠在空气中燃烧的实验和钠暴露在空气中的实验, 通过观察实验现象, 比较产物的不同, 可得出: 反应物相同时, 反应条件不同则产物可能不同。运用了观察法、实验法、比较法。

4. (1) 钠与硫酸铜溶液反应时, 先发生钠与水的反应: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$, 后 NaOH 与 CuSO_4 反应生成蓝色的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀: $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$

(2) 金属钠与氧气反应易生成过氧化钠。而此反应中产生 N_2 , N_2 起到保护气的作用, 防止氧化钠被氧化

(3) 紫色石蕊溶液先变为红色, 而后又变为无色 Cl_2 与 H_2O 发生化学反应: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{HCl} + \text{HClO}$, 使溶液显酸性, 紫色石蕊溶液遇酸变红色, HClO 有漂白性, 红色的石蕊溶液被 HClO 漂白而褪色

(4) 用碱液吸收

5. (1) 探究 Cl_2 与水是否反应(合理即可)

(2) B 中干燥的有色布条不褪色, 而 C 中湿润的有色布条褪色



【解析】(2) B 中干燥的有色布条不褪色, 而 C 中湿润的有色布条褪色。说明干燥的 Cl_2 不具有漂白性, 而 Cl_2 与水的反应产物 HClO 具有漂白性。

(3) Cl_2 有毒, 实验室用 NaOH 溶液吸收氯气进行尾气处理, 其反应的化学方程式为 $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$ 。



第3节 化学中常用的物理量——物质的量

★教材 P31【练习与活动】

1. (1) 6.02×10^{23} 2 (2) 4.816×10^{24}

(3) 1.204×10^{24} (4) 3 (5) 5:8 5:8

(6) 0.5 mol 2 mol · L⁻¹ (7) 9.03×10^{23}

【解析】(1) 1 mol H₂O 含有 6.02×10^{23} 个水分子; $n = \frac{N}{N_A} =$

$$\frac{1.204 \times 10^{24}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 2 \text{ mol}。$$

(2) O 原子的核外电子数为 8, 故 1 mol O 含有 4.816×10^{24} 个电子。

(3) 2 mol H⁺ 含有 1.204×10^{24} 个 H⁺。

$$(4) n = \frac{N}{N_A} = \frac{1.806 \times 10^{24}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 3 \text{ mol}。$$

(5) 分子数之比等于物质的量之比, 故 5 mol CO₂ 与 8 mol SO₂ 的分子数之比为 5:8, 由于 CO₂、SO₂ 都属于 3 原子分子, 因此二者的原子总数之比也为 5:8。

$$(6) n = \frac{m}{M} = \frac{28 \text{ g}}{56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.5 \text{ mol}, c = \frac{n}{V} = \frac{0.5 \text{ mol}}{0.25 \text{ L}} = 2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}。$$

$$(7) n = \frac{V}{V_m} = \frac{33.6 \text{ L}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1.5 \text{ mol}, N = nN_A = 1.5 \text{ mol} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 9.03 \times 10^{23}。$$

2. 在 CO 与 H₂ 生成 CH₃OH 的化学反应中, 实际参加的反应物和生成物之间有一些定量关系:

	CO + 2H ₂ $\xrightarrow{\text{一定条件}}$ CH ₃ OH			
系数比	1	: 2	:	1
质量比	7	: 1	:	8
物质的量比	1	: 2	:	1
气体体积比	1	: 2	:	1
分子个数比	1	: 2	:	1

物质的化学反应不仅以一定质量比进行, 还以一定微粒数比或一定物质的量比进行。因此将物质的量(n)、摩尔质量(M)、气体摩尔体积(V_m)、物质的量浓度(c)等应用于化学方程式进行计算, 对于定量研究化学反应中各物质之间的定量关系, 会更加方便。

3. 不相等。把 1 mol Na₂CO₃ 溶于水稀释为 1 L, 所得溶液的物质的量浓度为 1 mol · L⁻¹; 106 g Na₂CO₃ 的物质的量为 1 mol, 把 106 g Na₂CO₃ 溶于 1 L 水中, 因所得溶液的体积不为 1 L, 故所得溶液的物质的量浓度不为 1 mol · L⁻¹。

4. 解法 1 是先求 m g SO₂ 和 m g SO₃ 所含 S 元素的质量, 再求 S 原子的个数, 最后求 SO₂ 和 SO₃ 中所含 S 原子的个数比。

解法 2 是先求 m g SO₂ 和 m g SO₃ 的物质的量, 再求 S 原子的个数, 最后求 SO₂ 和 SO₃ 中所含 S 原子的个数比。

解法 3 是先求 m g SO₂ 和 m g SO₃ 的物质的量, 再用 SO₂ 与



SO_3 的物质的量比代替 SO_2 和 SO_3 中所含 S 原子的个数比。

我倾向于使用解法 3, 因为它不仅原理正确而且解法简便。

- 5. B** 【解析】该溶液的体积未知, 因为 100 mL 水与 HCl 气体混合后, 溶液体积不再是 100 mL, 溶液的密度也未知, 所以无法计算出该溶液中溶质的物质的量浓度, A 错误, B 正确; 4 °C 时, 水的密度为 $1 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 故 100 mL 水的质量为 100 g, 标准状况下 22.4 L HCl 气体的物质的量为 1 mol, 质量为 36.5 g, 故该溶液溶质的质量分数为 $\frac{36.5 \text{ g}}{136.5 \text{ g}} \times 100\% \approx 26.7\%$, 可以求出, C 错误; 溶液的体积并不等于溶剂和溶质的体积之和, D 错误。

6. 6.02×10^{20}


【解析】 $M(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2) = (12 \times 8 + 1 \times 10 + 14 \times 4 + 16 \times 2) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 194 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $m(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2) = 0.194 \text{ g}$, $n(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2) = \frac{m(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2)}{M(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2)} = \frac{0.194 \text{ g}}{194 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.001 \text{ mol}$, $N(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2) = n(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2) \times N_A = 0.001 \text{ mol} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 6.02 \times 10^{20}$ 。

7. (1) $1 \times 10^{-6} \text{ mol}$ (2) $2 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 、 1.204×10^{18}

【解析】(1) $M[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2] = (195 + 17 \times 2 + 71) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 300 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, $n[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2] = \frac{3 \times 10^{-4} \text{ g}}{300 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 。
(2) $n(\text{N}) = 2n[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2] = 2 \times 10^{-6} \text{ mol}$, $N(\text{N}) = n(\text{N}) \times N_A = 2 \times 10^{-6} \text{ mol} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 1.204 \times 10^{18}$ 。

8. 1.204×10^{23}

【解析】标准状况下, 4.48 L 一氧化碳的物质的量 $n(\text{CO}) = \frac{V(\text{CO})}{V_m} = \frac{4.48 \text{ L}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.2 \text{ mol}$ 。



$\frac{2 \text{ mol}}{0.2 \text{ mol}} = \frac{2 \text{ mol}}{n(\text{CO}_2)}$, 解得 $n(\text{CO}_2) = 0.2 \text{ mol}$ 。0.2 mol CO_2 所含 CO_2 的分子个数 $N(\text{CO}_2) = n(\text{CO}_2) \times N_A = 0.2 \text{ mol} \times 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} = 1.204 \times 10^{23}$ 。

9. 500.0 L

【解析】 $c(\text{Mg}^{2+}) = \frac{4.8 \times 10^{-2} \text{ g}}{24 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1.0 \text{ L}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

$V[\text{Mg}^{2+}(\text{aq})] = \frac{n(\text{Mg}^{2+})}{c(\text{Mg}^{2+})} = \frac{1.0 \text{ mol}}{2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 500.0 \text{ L}$ 。

10. (1) 16.3 (2) CDBAGFE

【解析】(1) 根据溶液的质量分数与物质的量浓度的关系

可得浓硫酸的物质的量浓度 $c = \frac{1000 \rho w}{M} =$

$\frac{1000 \frac{\text{mL}}{\text{L}} \times 1.84 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \times 98\%}{98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 18.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 溶液稀释




前后溶质的物质的量不变,则 $V \times 18.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 100 \text{ mL} \times 3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $V \approx 16.3 \text{ mL}$ 。

(2) 配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,需要注意的事项:要把浓硫酸倒入装有蒸馏水的烧杯中,等冷却后,转移到容量瓶中,且要把玻璃棒和烧杯洗涤 2~3 次,再把洗涤液一并转移到容量瓶中。

本章自我评价

1. **D** 【解析】Na 易与空气中的 H_2O 、 O_2 发生反应,故要隔绝空气保存,但是不需要棕色试剂瓶,A、C 错误; CCl_4 的密度大于 Na,Na 的密度大于煤油且与煤油不发生反应,B 错误,D 正确。
2. **D** 【解析】钠浮在水面上,说明钠的密度比水小;钠熔化成小球,说明钠的熔点低,钠与水的反应为放热反应;反应后溶液变红,说明钠与水反应产生了碱性物质,故选 D。
3. **B** 【解析】A 项, Cl_2 能溶于水,不能用排水法收集,错误;B 项,新制氯水中含有 HClO , HClO 具有漂白性,可以使干燥的有色布条褪色,正确;C 项,氯气可以杀菌消毒与其强氧化性有关,而与其是否具有刺激性气味无关,错误;D 项,氢气在氯气中燃烧产生苍白色火焰,错误。
4. **C** 【解析】Cu 不能与盐酸反应,A 错误;Fe 与 Cl_2 发生化合反应生成 FeCl_3 ,Fe 与盐酸反应生成 FeCl_2 和 H_2 ,B、D 错误。
5. **C** 【解析】溶液的体积为 1 L,而不是用 1 L 水溶解,故 A、B 错误;配制 1 L $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 溶液所需胆矾的物质的量为 0.1 mol,质量为 25 g,故 C 正确,D 错误。
6. **B** 【解析】钠原子失去电子变为钠离子,A 错误; $0.2N_A$ 个 H_2SO_4 分子中含有 $0.8N_A$ 个 O 原子,19.6 g H_3PO_4 的物质的量为 0.2 mol,故也含有 $0.8N_A$ 个 O 原子,B 正确;28 g N_2 的物质的量为 1 mol,故含有 $2N_A$ 个原子,C 错误; N_A 个 O_2 分子与 H_2 分子的物质的量都为 1 mol,故质量之比为 $32:2=16:1$,D 错误。
7. **D** 【解析】方法一:根据反应 $2\text{Hg} + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{HgO}$ 可知,0.2 mol Hg 和 0.2 mol O_2 反应时,有 0.2 mol Hg 和 0.1 mol O_2 参加了反应,生成 0.2 mol HgO,剩余 0.1 mol O_2 。
方法二:由化学方程式可知, O_2 过量,0.2 mol Hg 全部参加了反应。



因为 $\frac{2 \text{ mol}}{0.2 \text{ mol}} = \frac{1 \text{ mol}}{n_{\text{反应}}(\text{O}_2)} = \frac{2 \text{ mol}}{n_{\text{生成}}(\text{HgO})}$, 所以 $n_{\text{反应}}(\text{O}_2) = 0.1 \text{ mol}$, $n_{\text{生成}}(\text{HgO}) = 0.2 \text{ mol}$, $n_{\text{剩余}}(\text{O}_2) = n_{\text{总}}(\text{O}_2) - n_{\text{反应}}(\text{O}_2) = 0.2 \text{ mol} - 0.1 \text{ mol} = 0.1 \text{ mol}$ 。

8. ① $4\text{Na} + \text{O}_2 \xrightarrow{\quad} 2\text{Na}_2\text{O}$ ② $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\quad} 2\text{NaOH}$
 ③ $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \xrightarrow{\quad} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\quad} \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

【解析】金属钠露置在空气中发生了如下变化:银白色金属



钠(Na) $\xrightarrow{①O_2}$ 表面变暗(生成 Na_2O) $\xrightarrow{②H_2O}$ 出现白色固体
(生成 $NaOH$) $\xrightarrow{H_2O}$ 表面出现液滴($NaOH$ 潮解) $\xrightarrow{③CO_2}$ 白色
块状物质(生成 $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)。

9. (1) ①高坡上

②用小苏打溶液($NaHCO_3$ 溶液)浸湿毛巾,捂住口鼻

③用蘸有肥皂水的湿毛巾,捂住口鼻



(3) 氯气的密度大于空气,因此人往高处跑;由于 Cl_2 能与碱发生反应,可以就近寻找碱性物质配制成溶液浸湿毛巾,捂住口鼻,但是不能用强碱溶液,因为强碱具有很强的腐蚀性,氯气与 $Ca(OH)_2$ 发生反应,从而被吸收,降低危害。

10. (1) 各需 50 mL

(2) 知道某溶液中溶质的物质的量浓度,取用一定体积的溶液,就可计算出其所含溶质的物质的量,进行化学计算十分方便。

【解析】(1) 由题意结合化学方程式,可列式:



$$22.4 \text{ L} \quad 2 \text{ mol}$$

$$2.24 \text{ L} \quad V_1(NaOH) \times 4.0 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$V_1(NaOH) = \frac{2 \text{ mol} \times 2.24 \text{ L}}{22.4 \text{ L} \times 4.0 \text{ mol} \cdot L^{-1}} = 0.050 \text{ L} = 50 \text{ mL}。$$



$$22.4 \text{ L} \quad 80 \text{ g}$$

$$2.24 \text{ L} \quad V_2(NaOH) \times 1.14 \text{ g} \cdot mL^{-1} \times 14\%$$

$$V_2(NaOH) = \frac{2.24 \text{ L} \times 80 \text{ g}}{22.4 \text{ L} \times 1.14 \text{ g} \cdot mL^{-1} \times 14\%} \approx 50 \text{ mL}。$$

11. (1)

应量取的浓盐酸体积/mL	应选用的容量瓶规格/mL
2.1	250

(2) BCA FED

(3) 将玻璃棒和烧杯上残留的盐酸一并转移到容量瓶中,减少误差 液体热胀冷缩,浓盐酸稀释放热,液体体积增大,会导致加入的蒸馏水偏少,带来误差

(4) ①偏低 ②偏低 ③偏高


(5) ①重新配制 ②重新配制

【解析】(1) 该浓盐酸的物质的量浓度 $c = \frac{1000\rho w}{M} =$

$$\frac{1000 \times 1.18 \times 36.5\%}{36.5} \text{ mol} \cdot L^{-1} = 11.8 \text{ mol} \cdot L^{-1}, \text{ 根据溶液稀}$$

释前后溶质的物质的量不变,有 $V \times 11.8 \text{ mol} \cdot L^{-1} = 250 \text{ mL} \times 0.1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$, 则 $V \approx 2.1 \text{ mL}$ 。

(4) ①没有洗涤烧杯、玻璃棒,会损失一部分溶质,造成配制的溶液浓度偏低;②加入蒸馏水过多,造成配制的溶液浓度偏低;③定容时俯视刻度线,如图,则加入蒸馏水偏少,造成配制的溶液浓度偏高。





(5) 出现题述两种情况,都需要重新配制溶液。

12. (1) D 加热前通一段时间经装置 A 处理后的空气,是为了排尽装置中的空气,减少空气中二氧化碳对实验的影响;停止加热后通一段时间经装置 A 处理后的空气,将生成的 CO_2 赶入装置 D 中,并防止装置 C 中液体倒吸入装置 B

(2) 偏大 (3) 3.36 L

【解析】(1) 装置 A 可除去空气中的二氧化碳,防止空气中的二氧化碳影响实验结果,造成误差;装置 C 除去混合气体中的水蒸气;装置 D 可用来吸收生成的二氧化碳,通过测定装置 D 反应前后的质量差,可以确定样品分解产生二氧化碳的质量。

(2) 若没有装置 E,空气中的二氧化碳和水进入装置 D,导致所测得的二氧化碳的质量偏大。

$$(3) n = \frac{m}{M} = \frac{6.6 \text{ g}}{44 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.15 \text{ mol}, V = V_m \cdot n = 22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \times 0.15 \text{ mol} = 3.36 \text{ L}。$$