



小卷提速 · 限时

限时小卷 ▶ 1

1. **C** 【解析】本题考查实验对照的设置。

检测梨匀浆中的还原糖时,用葡萄糖溶液作为阳性对照,可验证斐林试剂的有效性及显色反应,**A 不符合题意**;在比较过氧化氢在不同条件下的分解的实验中,需设置对过氧化氢不作任何处理的空白对照组,**B 不符合题意**;一般情况下,处于自然状态的是对照组,施加实验变量处理的是实验组,在探究土壤微生物的分解作用的实验中,对照组的土壤不作处理(自然状态,含有土壤微生物),**C 符合题意**;探究培养液中酵母菌种群数量的变化的实验为前后自身对照实验,不需另设对照组,**D 不符合题意**。

2. **D** 【解析】本题考查生态农业及能量流动。

稻虾轮作是一种全新的绿色生态种养模式,稻虾轮作模式的稻田可以通过调整种间关系等方式,来减少农药的使用量,**A 错误**;有机肥会被分解者分解为无机物后再供生产者利用,并且其中的能量不直接流入生产者,**B 错误**;水稻固定的总能量约 10%~20% 通过食物链流入下一营养级,除虾和人外,第二营养级还有其他生物(注意:能量传递效率是相邻两个营养级间的同化量比值),**C 错误**;虾捕食害虫和杂草减少了流向害虫和杂草的能量,使更多能量流向虾和人类(注意:流向虾的能量也可被人利用),即有利于更多能量流向对人有益的部分,**D 正确**。

3. **C** 【解析】本题考查端粒酶与端粒。

端粒是每条染色体的两端的一段有特殊序列的 DNA—蛋白质复合体,端粒 DNA 序列在每次细胞分裂后会缩短一截,**A 错误**。端粒酶是一种含有 RNA 序列的核糖核蛋白,可利用自身 RNA 中的一段重复序列为模板合成端粒 DNA,因此,其结构中的蛋白质分子催化的是逆转录过程中的磷酸二酯键形成,**B 错误**。端粒酶结合在染色体末端,以自身 RNA 序列为模板通过逆转录延伸端粒 DNA,防止端粒 DNA 因细胞分裂而缩短导致的基因损伤,保护端粒内侧正常基因的 DNA 序列,**C 正确**。正常细胞中原癌基因和抑癌基因也会正常表达,这两类基因发生突变或表达情况异常等才可能致癌,**D 错误**。

要点归纳

原癌基因突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,以及抑癌基因突变或表达受抑制而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,都可能引起细胞癌变。

4. **A** 【解析】本题考查细胞呼吸过程及影响因素。

根据实验结果可知,实验组丙酮酸相对含量降低,但 CO_2 量和 ATP 合酶活性增大,可能是丙酮酸进入线粒体后消耗加快导致的,因此可能是补剂 X 促进有氧呼吸第二和第三阶段,**A 正确**;小鼠骨骼肌细胞无氧呼吸不产生 CO_2 , CO_2 仅来自有氧呼吸第二阶段,实验组 CO_2 量升高,说明补剂 X 可促进有氧呼吸第二阶段,而非无氧呼吸第二阶段,**B 错误**;酶乙是 ATP 合酶,位于线粒体内膜上,有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,酶乙催化 ATP 生成,实验组线粒体内膜上酶乙活性升高,可加速有氧呼吸第三阶段的 ATP 生成,**C 错误**;无氧条件下,细胞仅进行无氧呼吸,两组细胞呼吸底物(葡萄糖)初始浓度一致,且



补剂 X 影响的是线粒体功能,对无氧呼吸过程无直接影响,故两组细胞产生的乳酸量不会有显著差异,**D 错误**。



15 s 速解

北京大学 徐欧翔

要建立“底物少了+产物多了=通路被加速”的守恒思维。丙酮酸相对含量下降而 CO_2 增多,说明丙酮酸消耗加快,即有氧呼吸的第二、三阶段被促进(该实验在有氧条件下进行),**A 项正确**。

5. **D**

题目解读

(1) 实验分组:①④为对照组,假手术排除手术对大鼠的影响,相当于空白对照组;②⑤为卵巢激素水平下降模型组,相当于条件对照组;③⑥为实验组。

(2) 实验目的:探究小檗碱(BBR)能否改善大鼠抑郁。

(3) 自变量:大鼠种类(普通大鼠、无菌大鼠)、是否去除卵巢、是否注射 BBR。

(4) 因变量:抑郁程度。

(5) 实验结果分析:由题图可知,普通大鼠和无菌大鼠在去除卵巢后,抑郁程度均加重;而 BBR 可以改善正常大鼠的抑郁,但基本不能改善无菌大鼠的抑郁。

【解析】本题考查实验探究。

人脑的高级功能有语言、学习、情绪等,高兴、抑郁等情绪均属于人脑的高级功能,**A 正确**;卵巢主要分泌雌激素,去卵巢大鼠可通过注射雌激素以维持正常的激素水平,**B 正确**;对比②③可知,BBR 能有效缓解普通大鼠的抑郁情况,对比⑤⑥可知,BBR 不能有效缓解无菌大鼠的抑郁情况,由此可以推测 BBR 改善雌鼠的抑郁行为可能依赖肠道菌群,**C 正确**;为进一步证实结论,可将③组大鼠的粪菌移植给⑥组大鼠,并观察⑥组大鼠抑郁程度的变化,**D 错误**。

6. **C** **【解析】**本题考查假说—演绎法。

孟德尔的豌豆杂交实验中, F_1 自交得到 3:1 的性状分离比是实验观察到的现象,属于假说提出的基础,而非实验验证过程,**A 错误**。孟德尔对分离现象的原因提出的假说包括:①生物性状由遗传因子决定;②在体细胞中,遗传因子成对存在;③形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中;④受精时,雌雄配子的结合是随机的。其中假说的核心是形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,**B 错误**。演绎推理指基于假说内容预测实验结果。孟德尔设计测交实验,并预测 F_1 测交后代性状比例为 1:1,属于演绎推理过程,**C 正确**。模拟实验是对分离现象的演示,属于帮助理解假说的手段,并非真实的生物实验验证,实验验证需通过实际的杂交实验(测交)完成,**D 错误**。

7. **D** **【解析】**本题考查血糖平衡的调节。

根据题意,3 个样品中任意 1 个血糖浓度测定值大于参考值即可判定为 GDM,题表中该孕妇餐后 1 h、2 h 血浆的两个样品血糖浓度测定值均大于参考值,因此可判定为 GDM,进一步检测胰岛素等指标,能够评估胰岛的分泌功能,**A 正确**;孕期孕妇体内的孕激素、雌激素等激素水平会显著升高,可能会降低胰岛素的敏感性,使身体对胰岛素的需求增加,若胰岛无法分泌足够的胰岛素,就可能会引发 GDM,**B 正确**;控制饮食总热量可以减少糖分和能量的摄入,增加低强度运动(如散步)可以增加血糖的消耗,从而降低患 GDM 的风险,**C**



正确；该孕妇餐后 1 h 血糖超标可能是孕妇对胰岛素敏感性下降导致的，需要先查清血糖超标的原因，不能“立即注射胰岛素治疗”，**D 错误**。

8. D 【解析】 本题考查水体生态修复。

纳米曝气能提高水体中的溶氧量，进而可促进湖底淤泥中和微生物膜上需氧微生物的有氧呼吸，但会抑制厌氧微生物的生命活动，**A 错误**；在生态工程中，有效选择生物组分并合理布设体现了自生原理（注意：协调原理体现在生物与生物、生物与环境之间的协调与适应），**B 错误**；虽然扩大人工浮床的面积可以增强浮床植物的竞争优势，但过度扩大可能会抑制其他植物（如沉水植物）生长，从而破坏生态平衡，**C 错误**；该生态修复体系，体现的是对生态环境的保护和修复，即体现了生物多样性的间接价值（要点：生物多样性的间接价值主要体现在调节生态系统的功能等方面），**D 正确**。

要点归纳 水体富营养化

(1) 概念：指水体中氮、磷等植物营养物质的富集，引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖，导致水体溶氧量下降，进而引起水生生物衰亡、水质恶化的现象。

(2) 治理方法：利用需氧微生物与厌氧微生物降解有机污染物的作用和植物的根系能够从水体中吸收氮、磷等营养元素的作用，依据生态工程的基本原理进行合理设计，对污染的生态环境进行修复，从而达到改善和净化水质的目的。

9. C 【解析】 本题考查多倍体与生殖隔离。

由题意可知，该四倍体是由其二倍体祖先经染色体加倍形成的，染色体上的基因数量会加倍，但并不是细胞中所有基因的数量都会加倍，比如细胞质基因的数量不一定会随染色体加倍而加倍，**A 错误**；四倍体更适应低温环境的原因可能是多方面的，题干信息没有明确是基因产物总量倍增导致的，也可能是染色体加倍后抗逆相关基因表达增强等原因，**B 错误**；二倍体和四倍体存在生殖隔离，两者杂交形成的后代是三倍体，由于三倍体减数分裂时会出现联会紊乱现象，无法产生正常配子，因此二者杂交后代会出现不育的现象，**C 正确**；饰纹姬蛙在山区和低地的不同分布属于地理隔离，地理隔离是形成生殖隔离的常见条件，但不是必要条件（常考：生殖隔离是新物种形成的标志，但不是地理隔离必然的结果），**D 错误**。

10. D 【解析】 本题考查受精与胚胎发育。

透明带反应和卵细胞膜反应是防止多精入卵的两道屏障，过程 1 存在这两道屏障是半同卵双胞胎极其罕见的主要原因，**A 正确**；过程 2 所示的 P1、P2 为两个雄原核，M 为一个雌原核，**B 正确**；由题图可知，内细胞团一分为二后，滋养层细胞并未分开，滋养层细胞将来发育成胎膜和胎盘的一部分，故推测内细胞团一分为二发育成的双胞胎共用一个胎盘，**C 正确**；半同卵双胞胎的受精卵含有两套父源染色体和一套母源染色体，胚胎发育过程中内细胞团一分为二，各自带有不同比例的 MP1 和 MP2 细胞，导致每个胚胎的体细胞性染色体组成不一定均为 XX 或 XY，**D 错误**。

11. D

题目解读

分析题图 1，一定范围内，随着鼠兔洞口数增加，植被物种丰富度先增加后减小，洞口数为 205 时达到最大值。

分析题图 2，在一定范围内，随着鼠兔洞口数增加，植被物种多样性先增加后减小，洞口数为 218 时达到最大值。



【解析】本题考查种群特征调查。


根据题目解读可知，**A 正确**；根据题图，在鼠兔洞口数大于 205 个/ hm^2 时，植被物种丰富度开始下降，植被物种多样性在鼠兔洞口数大于 218 个/ hm^2 时，也开始下降，因此将该高寒草地的鼠兔数量控制在洞口数 ≤ 205 个/ hm^2 为宜，**B 正确**；鼠兔洞口周边的植物被鼠兔啃食后，土壤容易丢失水分，因此鼠兔洞口周边新长出的植物比原植物更耐旱，**C 正确**；调查时，需要利用无人机航拍统计一定范围内洞口的数量，本质还是样方法，**D 错误**。

易错总结 物种丰富度与物种多样性辨析

一个群落中的物种数目，称为物种丰富度；自然界中每个物种都具有独特性，从而构成了物种的多样性。

12. A

题目解读



【解析】本题考查气孔开闭与光合作用。

根据题目解读可知，过程①②③发生在同一细胞中，**A 错误**；该植物白天气孔开放程度小，光合作用消耗的 CO_2 主要来源于苹果酸分解，即该植物白天 CO_2 吸收速率小于 O_2 释放速率，**B 正确**；由于夜间无光照，不能进行光反应，没有光反应提供的 ATP 和 NADPH，该植物在夜间无法通过卡尔文循环积累产物，**C 正确**；该模式下植物白天气孔开放程度小（要点：蒸腾速率受气孔开放程度的限制，气孔的开放程度会通过影响 CO_2 的吸收影响植物光合速率），有利于植物白天减弱蒸腾作用而保持水分，**D 正确**。


13. D 【解析】本题考查减数分裂与致死。

携带 T^- 的次级精母细胞死亡是减数分裂过程中 k 毒蛋白诱导的细胞凋亡，TT 纯合致死是胚胎发育阶段的致死，二者致死原因不同，**A 错误**。若抗性基因 R 在初级精母细胞中表达，合成的 R 蛋白会分配到所有次级精母细胞中，杂合雄蝇 TT^- 的携带 T^- 的次级精母细胞也会得到 R 蛋白而不会被诱导凋亡，与题干信息矛盾，**B 错误**。该雄蝇的次级精母细胞中，携带 T^- 且含 X 染色体的类型因无 R 蛋白保护会凋亡，因此并非所有携带 T^- 的精子都存活，**C 错误**。雌蝇 TT^- 减数分裂无特殊致死现象，产生的卵细胞中 $\text{T} : \text{T}^- = 1 : 1$ ；该雄蝇存活精子中 T 占 $\frac{2}{3}$ 、 T^- 占 $\frac{1}{3}$ ，精卵结合后 TT 纯合致死，故存活子代中 $\text{TT}^- : \text{T}^- \text{T}^- = \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \right) : \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \right) = 3 : 1$ ，**D 正确**。

14. D

题目解读

图中GABA_B受体被激活后,促进K⁺通道开放,从而促进K⁺外流,同时抑制Ca²⁺内流



5-羟色胺神经元释放的5-羟色胺与突触前细胞的5-羟色胺受体结合→K⁺通道关闭,抑制K⁺外流→促进Ca²⁺内流→促进突触小泡与突触前膜融合→促进突触前细胞释放神经递质

图中GABA_A受体被激活后,促进Cl⁻内流

【解析】本题考查突触传递机制。


题图中的突触前细胞也能作为5-羟色胺神经元和GABA能神经元的突触后靶细胞, **A 正确**; 根据题目解读可知, 5-羟色胺神经元能促进突触前细胞释放神经递质, **B 正确**; 题图中GABA_A受体被激活后, 促进Cl⁻内流, 使膜电位外正内负的差值增大, 突触前细胞被抑制, 从而抑制突触前细胞释放神经递质, **C 正确**; 根据题目解读可知, GABA_B受体被激活后, 促进K⁺通道开放, 从而促进K⁺外流, 同时抑制Ca²⁺内流, 使膜外的正电荷增多, 外正内负的差值增大, 即突触前膜局部膜电位并没有反转, 仍然是外正内负, **D 错误**。

15. D **【解析】**本题考查基因转录的调控。

据题图可知增强子通过与激活因子结合来发挥作用, **A 错误**; 增强子的作用是增强A蛋白基因表达, 其序列改变不会引起A蛋白空间结构的改变, **B 错误**; 转录启动需要RNA聚合酶, 因此“?”处代表RNA聚合酶, 增强子是编码A蛋白的基因上游的一段增强基因表达的DNA序列, 故增强子可以增强RNA聚合酶与启动子的结合, **C 错误**; 题图中激活因子与增强子结合后在介导因子作用下, 与邻近区域启动子结合, 即该过程需要染色质弯曲缠绕, 使增强子靠近相应的基因, 从而发挥转录增强作用, **D 正确**。

16. C

题目解读



【解析】本题考查基因工程操作程序。

将M1和M2片段分别插入质粒的Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ酶切位点之间, 可以避免破坏含有N基因的质粒上的启动子、终止子和N基因, 确保N基因能够在菌株B2中正常表达, **A 正确**。向导RNA与DNA进行碱基互补配对, 可形成的碱基对有G—C、C—G、A—T、U—A, **B 正确**。以细菌B2基因组为模板, 用引物P1和P2可以扩增出N基因, 可以验证片段甲插入了细菌B1的基因组; 用引物P3和P4进行PCR, 因为片



段甲(M1+启动子+N 基因+终止子+M2)中没有 P4 的结合区域,故无法得到 PCR 扩增产物,**C 错误**。基因工程操作中,常先用 Ca^{2+} 处理微生物细胞,再将重组基因的表达载体导入其中,**D 正确**。



1 min 速解

北京大学 徐欧翔

PCR 引物题用“引物结合位点有无”秒杀

验证插入是否成功,关键看引物对能否在模板上找到结合区。P1、P2 针对 N 基因两端,若以 B2 基因组为模板可扩增出 N 基因,则可证明片段甲已插入;而 P4 的结合区域位于片段甲替换区,片段甲(M1+启动子+N+终止子+M2)插入后该区域已不存在,P4 无结合位点,用 P3 和 P4 进行 PCR 得不到产物,判断 C 项错误。

限时小卷 ▶ 2

1. **B** 【解析】本题考查生物膜的结构。

参与细胞间的信息交流的蛋白质主要是细胞膜表面的糖蛋白,细胞膜上的转运蛋白的作用是参与物质的跨膜运输,**A 错误**;类囊体薄膜是光反应的场所,其上含有光合色素,如叶绿素和类胡萝卜素,这些光合色素能吸收、传递和转化光能,**B 正确**;线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,而丙酮酸分解发生在有氧呼吸的第二阶段,场所是线粒体基质,**C 错误**;核孔是 RNA 和蛋白质等大分子进出细胞核的通道,核孔具有选择性(易错:核孔在控制物质进出时具有选择性),**D 错误**。

2. **B** 【解析】本题考查神经中枢的定位。

下丘脑中有水盐平衡调节的中枢,可以感受细胞外液渗透压变化,能分泌抗利尿激素,因此,若损伤发生在下丘脑时,患者可能出现水盐平衡失调(拓展:下丘脑中有体温、水盐平衡、血糖等的调节中枢),**A 正确**;大脑皮层的 V 区损伤时,患者能讲话、书写,但不能看懂文字,**B 错误**;缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,此时患者的缩手反射和膝跳反射仍可发生,因为缩手反射和膝跳反射的神经中枢在脊髓,**C 正确**;短时记忆的形成与大脑皮层下的海马区有关,损伤发生在海马区时,患者可能很难形成短时记忆,**D 正确**。

3. **C** 【解析】本题考查发酵工程。

核桃仁中蛋白质含量丰富,是制作植物酸奶的良好原料,**A 正确**;植物乳植杆菌通过无氧呼吸产生乳酸,故核桃紫米乳冷却后添加植物乳植杆菌,应密封发酵产生乳酸,**B 正确**;灭菌会破坏核桃紫米酸奶的营养成分,酸奶灌装前应进行巴氏消毒(易错:误认为发酵产品灌装前需灭菌,实际应进行的是巴氏消毒,避免破坏营养成分,巴氏消毒法是一种低温消毒法,既能杀死有害微生物,又能保留食品营养和风味,广泛用于牛奶、酸奶等食品的加工),**C 错误**;可通过调整紫米(糖类物质含量多)和核桃(蛋白质含量多)的比例来调整核桃紫米酸奶的营养和口味,**D 正确**。

知识拓展

巴氏消毒法由巴斯德发明,常见温度和时间分别为 $63\sim 65\text{ }^{\circ}\text{C}$ 处理 30 分钟或 $72\sim 76\text{ }^{\circ}\text{C}$ 处理 15 秒或 $80\sim 85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 处理 10~15 s,可有效杀死绝大多数微生物,同时基本不会破坏营养成分。

4. **A** 【解析】本题考查细胞自噬过程。

根据题意可知,缺陷型酵母的自噬小体可被运输到液泡,但无



法被分解,说明缺陷型酵母是自噬小体的分解过程出现障碍导致的,**A 错误**。细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,自噬小体向液泡移动需细胞骨架支持,**B 正确**。饥饿时,野生型酵母通过细胞自噬可获得生存所需的部分物质和能量,缺陷型酵母无法分解自噬小体而导致能量短缺,故野生型酵母存活时间更长,**C 正确**。水解酶抑制剂会阻断液泡内的分解过程,导致自噬小体无法分解,使野生型酵母出现类似缺陷型的表型,**D 正确**。

5. A 【解析】本题考查 DNA 的粗提取及扩增。

DNA 不溶于酒精,但某些蛋白质溶于酒精,加入冷酒精后析出的白色丝状物是粗提取的 DNA,**A 错误**。沸水浴条件下,DNA 遇二苯胺试剂会呈现蓝色,高温会破坏 DNA 的双螺旋结构使其解旋,故沸水浴条件下 DNA 的双螺旋结构已解开,**B 正确**。DNA 电泳时,在凝胶中 DNA 分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA 分子的大小和构象等有关,**C 正确**。电泳时加入的指示剂仅用于指示核酸的迁移进度,不会使 DNA 着色,为防止 DNA 跑出凝胶,需要在指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时停止电泳,**D 正确**。

6. B 【解析】本题考查生物多样性。

水稻分蘖产生新个体属于营养繁殖,是无性生殖的一种,无性生殖产生的后代遗传物质与母本基本一致,不会增加种群的基因种类,无法提高遗传多样性,**A 错误**。人工选择是定向的,会定向保留所需性状,淘汰不需要的性状,使水稻种群的基因频率发生定向改变,**B 正确**。长期大规模单一种植该多年生水稻,会导致稻田物种丰富度降低,营养结构简单,生态系统的自我调节能力减弱,抵抗力稳定性不会逐步增强,**C 错误**。生物多样性的直接价值包括对人类有食用、药用、作为工业原料等实用意义的价值,以及文学艺术创作、科学研究、旅游观赏等非实用意义的价值,利用野生稻的“长寿基因”培育新品种属于科学研究价值,体现的是生物多样性的直接价值,**D 错误**。

7. B 【解析】本题考查中性突变学说。

减数分裂过程中非姐妹染色单体的互换属于基因重组,不属于基因突变,且该过程产生新配子类型仅体现了变异的多样性,与中性突变无关,**A 不符合题意**;基因突变改变了氨基酸序列,但未改变蛋白质功能,说明该突变既没有提升生物的适应性,也没有损害生物的适应性,属于中性突变,可支持中性突变学说,**B 符合题意**;野生鲫鱼发生基因突变后,可通过人工选育得到观赏金鱼,说明该突变能改变生物性状且有选择价值,不属于中性突变,**C 不符合题意**;碱基替换引起镰状细胞贫血,该突变会损害生物的生存能力,属于有害突变,不支持中性突变,**D 不符合题意**。

知识拓展 生物进化理论的发展

(1) 中性学说:基因突变对生物适应性的影响并不是非益即害的,大量的基因突变是中性的,自然选择对这些基因突变不起作用,这些基因突变经过长期积累,会导致种群间遗传物质出现较大的差别。

(2) 物种形成的途径:许多物种是在短时间内迅速形成的,因此,也有人提出物种形成并不都是渐变的过程,而是物种长期稳定与迅速形成新物种交替出现的过程。



8. B

题目解读

光照下 CO_2 吸收速率代表植物的净光合速率,黑暗中 CO_2 释放速率代表植物的呼吸速率,植物的总光合速率=净光合速率(光照下 CO_2 吸收速率)+呼吸速率(黑暗中 CO_2 释放速率)。昼夜不停地光照,植物一天的有机物积累量=净光合速率 $\times 24$;每天交替进行 12 h 光照、12 h 黑暗,植物一天的有机物积累量=净光合作用速率 $\times 12$ -呼吸作用速率 $\times 12$ 。

【解析】 本题考查净光合速率计算。

光照下 CO_2 吸收速率表示净光合速率,题表中仅测量 6 组数据,没有探究其他温度的情况,因此无法确定 20~45 °C 之间,40 °C 一定是使该植物净光合速率最大的温度,**A 错误**;温度为 20 °C 时,光照下 CO_2 吸收速率(净光合速率)为 $1 \text{ mg} \cdot \text{h}^{-1}$,黑暗下 CO_2 释放速率(呼吸速率)为 $0.5 \text{ mg} \cdot \text{h}^{-1}$,一昼夜净积累可表示为 $1 \times 12 - 0.5 \times 12 = 6 (\text{mg})$,因此该植物能正常生长,**B 正确**;光合作用的产物有一部分是淀粉,还有一部分是蔗糖,蔗糖可以进入筛管,再通过韧皮部运输到植株各处,**C 错误**;题表中 40 °C 时净光合速率($3.75 \text{ mg} \cdot \text{h}^{-1}$)大于 35 °C 时的($3.25 \text{ mg} \cdot \text{h}^{-1}$),所以昼夜不停地光照,35 °C 不是最有利于有机物积累的温度,**D 错误**。

9. C **【解析】** 本题考查种间竞争类型。

一种藤壶通过直接覆盖、挤压排挤另一种藤壶,即一种藤壶通过直接的相互作用抑制另一种藤壶的生存和繁殖,符合题干描述的干扰性竞争的特征,**A 错误**;两种鸟类竞争的核心是昆虫这一有限的食物资源,其中一种鸟类通过改变繁殖时间提升资源获取能力,没有直接攻击、驱赶等干扰行为,两种鸟类未发生直接相互作用,而是通过争夺食物资源发生竞争,符合题干描述的利用性竞争,**B 错误**;利用性竞争和干扰性竞争会驱动物种发生生态位分化,降低生态位的重叠程度,使不同物种可分别利用环境中的不同资源,提高了不同物种对环境资源的整体利用率,**C 正确**;种间竞争的结果不都是导致弱势物种被淘汰,若竞争过程中两个物种发生生态位分化,可实现长期共存,**D 错误**。

知识拓展

竞争排除原理是指生态位完全相同的两个物种不能在同一栖息地长期共存,如果生存在同一地区,竞争力强的物种最终会排除竞争力弱的物种。但在自然界中,物种往往可通过生态位分化(资源利用方式、时间、空间的分离)实现共存。


10. C **【解析】** 本题考查微生物筛选与鉴定。

题图甲中,石油降解菌能降解培养基中的石油,使培养基中原本被石油覆盖的区域变得透明,从而形成透明圈,**A 正确**;题图乙中,尿素分解菌可将尿素分解为氨,氨溶于培养基中的水后,使培养基的 pH 发生变化,进而使指示剂变色,形成变色圈,**B 正确**;一定浓度的抗生素能杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性,抑菌圈直径的大小可反映药物的抑菌效果,抑菌圈直径越大,说明该菌对该抗生素的敏感性越强,细菌耐药性越弱,**C 错误**;在含特定营养物质的滤纸片周围形成生长圈,可利用这一原理筛选出营养合成缺陷型突变菌株,即自身不能合成该营养物质,需要从滤纸片处获取该营养物质,在其周围才能生长的菌株,**D 正确**。

知识拓展

抗生素对细菌的选择作用分析

一般情况下,一定浓度的抗生素能杀死细菌,但变异的细菌可能产生耐药性。在实验室连续培养细菌时,如果向培养基中添加抗生素,耐药菌有可能存活下来,结果如下:



注:①区域滤纸片不含抗生素,②③④区域滤纸片含抗生素,实验中滤纸片大小相同。

11. C 【解析】本题考查基因及植物激素对性状的影响。

根据题表数据分析可知,C 基因过表达植株的株高明显大于野生型植株的株高,同时萌发侧芽数也显著多于野生型植株的,说明 C 基因过表达能促进菊花植株的生长和侧芽的萌发,A 正确;据题表数据分析可知,与野生型植株相比,C 基因过表达植株的株高明显高于野生型植株的株高,侧芽生长素含量有所降低,而侧芽乙烯含量升高,据此可推测乙烯和生长素的相对含量可影响植株生长和侧芽萌发,B 正确;从题表数据可以看出,C 基因过表达植株中生长素和乙烯的含量都发生了变化,但并不能得出生长素和乙烯相互协同的结论,C 错误;植物生长发育的调控是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的,D 正确。

12. D 【解析】本题考查基因互作与自由组合。

纯合红斑花基因型为 $AAbb$,与纯白花个体杂交所得 F_1 全为纯红花($A_B_$),说明亲本纯白花需提供 B 基因,故亲本中纯白花基因型为 $aaBB$,A 错误; F_2 中,自交后代不发生性状分离的个体基因型包括: $AABB$ 、 $AAbb$ 、 $aaBB$ 、 $aabb$ 4 种纯合子,以及 $aaBb$ (自交后代均为 $aa_ _$,全为纯白花),共占 $\frac{1+1+1+1+2}{16} = \frac{3}{8}$,B 错误;基因型为 $Aabb$ 和 $aaBb$ 的两个单杂合个体杂交,后代也会出现纯红花、红斑花、纯白花 3 种花色,C 错误;纯白花基因型为 $aaBB$ 、 $aaBb$ 、 $aabb$,红斑花基因型为 $AAbb$ 、 $Aabb$,随机选取的纯白花和红斑花杂交后代的表型和亲本基因型组合是唯一的对应关系,可通过后代表型推知亲本基因型,D 正确。

13. C 【解析】本题考查食物网与能量流动。

拓扑网络中,食物链起点为生产者,捕食关系表示为被捕食者→捕食者,题图中包括 $D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 、 $D \rightarrow C \rightarrow A$ 和 $D \rightarrow A$,共 3 条食物链,A 正确;能流网络中能量沿着食物链流动,而物质是能量的载体,能量流动伴随着物质循环,B 正确;能量流动的特点是单向流动、逐级递减(注意:能流网络仍遵循能量流动逐级递减的规律),基于 A 取食偏好的能流网络也遵循这一规律,C 错误;在基于自然状态的能流网络中,A 捕食 B、C 和 D,B 捕食 C,C 捕食 D,所以 A 与 B 以及 A 与 C 之间均存在捕食和竞争关系,D 正确。

14. C 【解析】本题考查瘦素调节体重。

分析柱状图,2 组(野生型小鼠+高脂饮食)的瘦素受体相对值低于 3 组(M 基因敲除小鼠+高脂饮食),说明 M 基因表达的 M 蛋白可能通过降低瘦素受体数量,使瘦素无法有效发挥作用,从而引发瘦素抵抗,A 正确;分析体重变化曲线,高脂饮食下,3 组 M 基因敲除小鼠的体重增长慢于 2 组野生型小鼠的,表明 M 基因敲除能缓解高脂饮食导致的体重增加,B 正确;瘦素需与相应受体结合才能发挥作用,瘦素抵抗可能是因为瘦素受体不足或功能异常,因此补充外源瘦素不一定是治疗瘦素抵抗最有效的手段,C 错误;可增设

M 基因敲除小鼠+正常饮食组作为对照,与 1 组对比,研究 M 基因敲除在正常饮食下的作用效果,更明确 M 基因在体重调节中的作用,**D 正确**。

15. **D** 【解析】本题考查噬菌体 DNA 复制。

据题图分析可知,亲代噬菌体 DNA 为不平齐双链,但在 DNA 连接酶的作用下,遵循碱基互补配对原则,可以形成双链环状 DNA (注意:DNA 连接酶具有连接 DNA 片段的功能),说明整个 DNA 分子中的嘧啶数(T+C)和嘌呤数(A+G)是相等的,**A 错误**;题图中子代噬菌体的 a 链黏性末端序列为 5'-GGATC-3',该 DNA 首尾黏性末端互补配对,可以形成环状中间体,所以 b 链的黏性末端序列应为 5'-GATCC-3',**B 错误**;T2 噬菌体是 DNA 病毒,其 DNA 复制过程中模板由噬菌体自身提供(即亲代噬菌体的 DNA),原料(脱氧核苷酸)和能量由宿主大肠杆菌提供,**C 错误**;题图中酶 X 是将环状 DNA 切割成具有黏性末端的线性 DNA 的内切核酸酶,噬菌体自身的基因可以编码在复制过程中所需的酶,因此酶 X 可能由噬菌体自身基因编码,**D 正确**。

16. **D** 【解析】本题考查遗传系谱图及电泳条带分析。

根据电泳结果可知,I-1 出现两条电泳带说明其含有两种基因,为杂合子,由于 I-1 表型为正常眼,推测无眼为隐性性状,根据系谱图可知相关基因位于常染色体或 X 染色体上,**A 正确**。假设相关基因用 A/a 表示,根据系谱图及电泳结果,分别分析相关基因位于常染色体或 X 染色体的情况,如表:

控制无眼的基因位于常染色体上	控制无眼的基因位于 X 染色体上	结论
<p>II-3 的基因型及概率为 $\frac{1}{2}AA$、$\frac{1}{2}Aa$, II-4 的基因型为 AA, III-2 为纯合子(AA)的概率 = $\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$</p>	<p>II-3 的基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^AX^A$、$\frac{1}{2}X^AX^a$, II-4 的基因型为 X^AY, III-2 为纯合子(X^AX^A)的概率 = $\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$</p>	<p>无论控制无眼的基因位于常染色体还是 X 染色体, III-2 为纯合子的概率均为 $\frac{3}{4}$, B 正确</p>
<p>由于 II-1 为无眼雄蝇(aa),则其子代 III-1 的基因型为 Aa,结合上述分析可知, III-2 基因型为 Aa 的概率为 $\frac{1}{4}$,故 IV-1 为无眼(aa)的概率 = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$</p>	<p>III-1 为正常眼雄蝇,则其基因型为 X^AY,结合上述分析可知, III-2 基因型为 X^AX^a 的概率为 $\frac{1}{4}$,故 IV-1 为无眼(X^aY)的概率为 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$</p>	<p>无论控制无眼的基因位于常染色体还是 X 染色体, IV-1 为无眼的概率均为 $\frac{1}{16}$, C 正确</p>

若相关基因位于常染色体上,则 III-1 的 X 染色体来自 I-1 和 I-2 的概率相等;若相关基因位于 X 染色体上, II-2 的基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^AX^A$ 、 $\frac{1}{2}X^AX^a$,当 II-2 的基因型为 X^AX^A 时,传递给 III-1 的 X 染色体来自 I-1 或 I-2 的概



率均为 $\frac{1}{2}$; 当 II-2 的基因型为 $X^A X^a$ 时, 因 III-1 表型正常, 只能继承来自 I-2 的 X^A , 即 III-1 的 X 染色体来自 I-1 的概率 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 来自 I-2 的概率 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{3}{4}$, D 错误。

要点归纳**系谱图中个体基因型推导方法**

①确定遗传方式; ②从表型确定——隐性性状为隐性基因纯合, 显性性状至少含一个显性基因; ③亲子递推——子代一半基因来自父本, 一半来自母本; ④注意伴性遗传中雄性的 X 染色体来自母方。

限时小卷 ▶ 3**1. D 【解析】** 本题考查病毒核酸鉴定。

DNA 特有碱基为胸腺嘧啶 (T), RNA 特有碱基为尿嘧啶 (U), 检测核酸的碱基种类可区分 DNA 和 RNA, **A 正确**; 酶具有专一性, DNA 酶只能催化 DNA 水解, 若用 DNA 酶处理后病毒失去感染活性则说明其核酸为 DNA, 若仍有活性则为 RNA, **B 正确**; 尿嘧啶是 RNA 特有的碱基, 病毒增殖时合成核酸的原料来自宿主细胞, 若标记宿主细胞的尿嘧啶后子代病毒出现放射性, 说明该病毒的核酸为 RNA, 若无放射性则为 DNA, **C 正确**; 二苯胺试剂与 DNA 反应呈现蓝色常需要水浴加热的条件, 二者混合后立即观察无法得到正确结果 (常考: DNA 鉴定的原理是在一定温度下, DNA 遇到二苯胺试剂会呈现蓝色), **D 错误**。

易错总结**DNA 与 RNA 的鉴定方法**

- (1) 碱基组合法——检测是否含碱基 T (DNA) 或碱基 U (RNA)。
- (2) 酶解法——分别用 DNA 酶和 RNA 酶处理, 检测病毒的感染活性。
- (3) 显色反应——二苯胺试剂等。

2. C 【解析】 本题考查实验操作顺序。

高倍显微镜的正确操作是先在低倍镜下将目标物像移至视野中央, 再转动转换器换高倍镜, 高倍镜视野范围远小于低倍镜, 若先转动转换器换成高倍镜再移动物像, 原低倍镜下的目标大概率不在视野中, 可能无法观察到目标物像, **A 错误**; 酶具有高效性, 若先将酶与底物混合再调整温度, 混合后到达目标温度前酶已经和底物发生反应, 会干扰实验结果 (注意: 探究温度对酶活性的影响时, 需将酶和底物分别调整到对应实验温度后再混合), **B 错误**; 样方法调查种群密度的本质是计算单位面积内的个体数, 先统计所有样方总个体数再除以样方总面积, 和先计算每个样方的密度再取平均值的结果一样, **C 正确**; 观察洋葱根尖有丝分裂的步骤为解离→漂洗→染色→制片, 若先染色再漂洗, 解离液会干扰染色, 且漂洗时会冲掉染液, 无法正常观察, **D 错误**。

3. B 【解析】 本题考查蛋白质的跨膜运输。

胆固醇可以参与血液中脂质的运输, 且胆固醇属于内环境的成分, **A 正确**; 该标签可介导药物进入细胞质, 而胰岛素是与细胞膜表面的特异性受体结合后发挥作用, 不需要进入细胞, **B 错误**; 药物通过胞吞进入细胞时需要先与细胞膜上的蛋白质特异性结合, 再通过囊泡进入细胞, 而新型递送标签能够锚定在某些蛋白质药物表面, 在胆固醇插入细胞膜的磷脂双分子层的同时介导药物进入细胞质, 故 C-Tag 能够显著增强蛋



白药物入胞能力,C 正确;C-Tag 帮助药物进入细胞的过程中伴随着胆固醇插入细胞膜的磷脂双分子层,这个过程磷脂分子会发生移动,体现了细胞膜的结构特性,即具有一定的流动性,D 正确。

4. **D** 【解析】本题考查蛋白质工程。

绿色荧光蛋白是由绿色荧光蛋白基因控制合成的,A 正确;蛋白质工程需要根据预期蛋白质功能设计蛋白质三维结构,推导出多肽链氨基酸序列,进而推出相应的脱氧核苷酸序列(基因),该基因转录出相应 mRNA,进而翻译出所需蛋白质,所以题图中的 a 和 b 分别指多肽链和 mRNA,B 正确;蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过改造或合成基因,来改造现有蛋白质,或制造一种新的蛋白质,以满足人类生产和生活的需求,故蛋白质工程可合成自然界中不存在的蛋白质,C 正确;蛋白质工程是通过改造或合成基因来实现的,可见蛋白质工程需要对基因进行操作,D 错误。

5. **C** 【解析】本题考查群落的结构。

落叶阔叶林主要由落叶阔叶乔木层片、落叶灌木层片和多年生草本植物层片三类基本的层片构成,不同层片体现了群落在垂直方向的分层现象,属于群落空间结构中的垂直结构,反映了垂直方向的空间生态位分化,A 正确;群落不同层片是不同物种适应不同环境条件,从而在垂直方向形成的分层,是长期自然选择的结果,B 正确;群落的演替是一个群落代替另外一个群落的现象,群落的时间结构是指群落的组成和外貌随时间发生有规律的变化,属于群落的季节性变化(易错:群落的季节性 $\neq$ 群落的演替),C 错误;阳光、温度等因子会随着季节发生周期性的变化,能决定群落的时间结构,D 正确。

6. **D** 【解析】本题考查植物组织培养。

细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍然具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能,植物组织培养技术的原理是植物细胞具有全能性,A 正确;外植体需要消毒处理,使用比较温和的方法杀死外植体表面或内部一部分微生物,同时保留外植体活性,培养基、器皿需灭菌处理,彻底杀灭物体内外所有微生物,包括芽孢和孢子,保证无菌操作,B 正确;植物组织培养不同阶段需调控生长素与细胞分裂素的使用比例,如生长素用量与细胞分裂素用量比值为 1 时,促进愈伤组织形成,生长素用量与细胞分裂素用量比值大于 1 时能够诱导根分化,细胞分裂素用量与生长素用量比值大于 1 时,能够诱导芽分化,C 正确;植物细胞培养技术可实现细胞产物工厂化生产,如紫草宁(抗菌、消炎)、紫杉醇(抗癌)等植物细胞次生代谢物的工厂化生产,D 错误。

7. **B** 【解析】本题考查双相动作电位。


静息电位是细胞未受刺激时细胞膜内外的电位差,测量时需要一个电极在膜内、一个电极在膜外,而本题中两个电极都在神经外表面,未刺激蛙坐骨神经时,电流表记录的电位不是静息电位,A 错误;a、c 段分别是两个电极处形成动作电位的时候,形成的原因是 Na^+ 内流,b、d 段分别是两个电极处恢复静息电位的时候,形成的原因是 K^+ 外流,B 正确;增加细胞外 K^+ 浓度会减小静息电位的绝对值,不会增大动作电位的峰值(常考:动作电位的峰值由细胞内外 Na^+ 的浓度差决定),C 错误;神经冲动在神经纤维上的传导不会衰减,当两电极的距离太近,上相动作电位产生后,未恢复到静息电位状态,下相动作电位已开始,会出现双相动作电位下相峰值低于上相峰值的现象,D 错误。



8. A

题目解读

由ES细胞发育形成内细胞团，将来发育形成胎儿的各种组织



【解析】本题考查胚胎工程。

四倍体胚胎只能发育成胎盘等胚外组织，无法替代代孕母鼠，仍需要代孕母鼠提供发育所需的营养物质和环境，**A 错误**；ES 细胞具有发育的全能性，但 ES 细胞不能在体外条件下直接发育成完整个体，**B 正确**；该技术中，四倍体胚胎细胞可形成正常胎盘，支持 ES 细胞发育为完整个体，因此该技术可以为某些因胎盘缺陷导致的生育问题提供研究思路和解决方案，**C 正确**；四倍体胚胎细胞仅发育为胎盘等胚外组织，胎儿的组织细胞全部由注入的 ES 细胞发育而来，因此胎儿的遗传物质都来源于 ES 细胞，**D 正确**。

9. A 【解析】本题考查生态系统的能量流动。

若 B 摄入的能量比例增大，其同化量与未消化利用量也会增大，B 的同化效率（同化量与摄入量之比）可能不变，**A 错误**； $B \rightarrow C$ 的能量传递效率 = C 同化量 $\div$ B 同化量，生态系统中，能量在相邻两个营养级之间的传递效率通常在 10% ~ 20%（由能量损耗机制决定），若 B 的同化量减小，C 的同化量也会减小，二者之间的能量传递效率基本不变，**B 正确**；B 同化量 = 呼吸作用以热能形式散失的能量 + 流向下一营养级（C）的能量 + 未被利用的能量 + 流向分解者的能量，若 B 呼吸消耗的能量占其同化量的比例增大，则 B 传递给 C 的能量减少， $B \rightarrow C$ 的能量传递效率一般会下降，**C 正确**；同化效率 = 同化量 $\div$ 摄入量 = $(\text{摄入量} - \text{粪便中的能量}) \div \text{摄入量}$ ，若增大 B 的同化效率则粪便中的能量占比可能会减少，从而能够使更多能量流向养殖动物 B，能量利用效率增大，**D 正确**。

知识拓展

在农业生产过程中，可以通过优化饲料（如在饲料中添加酶制剂促进消化）提升养殖动物的能量利用（提高同化效率），减少粪便浪费，增加肉、蛋、奶的产量，体现了能量流动原理的实践价值。

10. C

题目解读

根据题干信息，野生型拟南芥 (E_1E_1) 对除草剂氯磺隆 (C) 和灭草烟 (I) 均敏感，两突变株 P_1 (E_1E_2) 和 P_2 (E_1E_3) 分别对 C 和 I 具有抗性， P_1 与 P_2 杂交， F_1 中存在同时抗 C 和 I 的个体 F_x （不考虑突变），因此推测表型与基因型的关系如下：

表型	野生型	只对除草剂氯磺隆 (C) 具有抗性	只对灭草烟 (I) 具有抗性	同时抗 C 和 I 的个体 (共显性)
基因型	E_1E_1	E_1E_2 、 E_2E_2	E_1E_3 、 E_3E_3	E_2E_3

【解析】本题考查孟德尔遗传规律。

两突变株 P_1 (E_1E_2) 和 P_2 (E_1E_3) 分别对 C 和 I 具有抗性，说明 E_2 和 E_3 对 E_1 为显性，所以 E_2 和 E_3 是显性突变，**A 错**

误; $P_1(E_1E_2)$ 和 $P_2(E_1E_3)$ 杂交, F_1 中基因型(表型)及比例为 E_1E_1 (野生型): E_1E_2 (只抗C): E_1E_3 (只抗I): E_2E_3 (抗C和I)=1:1:1:1,即 F_1 中有野生型子代,**B 错误**; F_1 中抗C(E_1E_2 和 E_2E_3 个体)和抗I(E_1E_3 和 E_2E_3 个体)的占比均为 $\frac{1}{2}$,因此两者的比例为1:1,**C 正确**;个体 F_x 是 F_1 中同时抗C和I的个体,基因型为 E_2E_3 ,自交子代中 E_2E_2 (只抗C): E_2E_3 (抗C和I): E_3E_3 (只抗I)=1:2:1,所以子代中抗C和抗I的比例相同,**D 错误**。

11. **B** 【解析】本题考查内环境稳态。

滑雪过程中肾上腺素和甲状腺激素含量升高进而代谢加快的过程,既有神经系统的调节,也有激素参与的体液调节,属于神经—体液调节,**A 错误**;人处于运动状态时交感神经活动占优势,可使心率加快、呼吸频率升高,能加快血液循环,提升气体交换效率,满足运动时机体对氧气的需求,**B 正确**;滑雪过程中会消耗大量葡萄糖,胰高血糖素分泌升高,从而升高血糖,血糖升高后会促进胰岛素的分泌,二者相互抗衡共同维持血糖平衡,**C 错误**;滑雪运动时机体代谢旺盛,产热增加,虽然冷风刺激会使排汗减少,但机体仍会通过皮肤血管舒张等方式增加散热,运动过程中体温升高是因为产热量大于散热量,并非散热减少导致,**D 错误**。

12. **B** 【解析】本题考查植物生命活动的调节。

由题图可知,春化作用途径、光周期途径、光质途径都可以通过影响相关基因的表达进而影响开花,**A 正确**;红光和远红光会使光敏色素的结构发生变化,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内,从而间接影响核基因的表达,而不是通过改变光敏色素的成分间接影响核基因表达,**B 错误**;由题图可知,FLC蛋白抑制开花,春化作用抑制FLC基因的表达,从而减弱FLC蛋白对开花的抑制,促进开花,**C 正确**;春化作用是指植物经过一段时间的持续低温后才能开花的现象,可避免植物在冬季来临之前开花,从而影响传粉,**D 正确**。

13. **D**

题目解读

竞争性抑制剂:和底物争夺酶的活性位点,增大底物浓度可削弱抑制作用,最终最大反应速率和对照组(不加酶抑制剂)相似;非竞争性抑制剂:与酶的活性位点以外的地方结合,无法通过增大底物浓度削弱抑制作用,最终最大反应速率低于对照组(不加酶抑制剂)。

分组	结果及结论分析
①清水组	作为空白对照组
②类黄酮组	底物浓度很低时,反应速率明显低于对照组,增大底物浓度后,最大反应速率和对照组①接近,说明类黄酮属于竞争性抑制剂
③IN-2组	无论底物浓度多高,最大反应速率始终远低于对照组,无法通过增加底物浓度削弱抑制作用,说明IN-2为非竞争性抑制剂

【解析】本题考查酶抑制剂类型。

该实验目的是探究酶抑制剂类型,先将酶与抑制剂混合,再加入底物,以确保抑制剂先与酶作用,可避免底物干扰实验,**A 正确**;在c点时,②组的尿素分解速率接近①组,曲线不再随底物浓度升高而明显上升,此时限制反应速率的主要因素是脲酶的数量,**B 正确**;该实验是在“最适温度”下进行的,适当升高温度,酶的活性会下降,因此③组尿素分解



速率会降低, **C 正确**; 根据题目解读可知, 类黄酮为竞争性抑制剂, IN-2 为非竞争性抑制剂, **D 错误**。

**1 min 速解**

北京大学 徐欧翔

酶抑制剂类型题用“能否通过增加底物浓度削弱抑制剂作用效果”判别: 加大底物浓度后实验组最大底物分解速率能“追平”对照组→竞争性抑制剂(类黄酮); 增加底物浓度“追不回”→非竞争性抑制剂(IN-2)。D 项把两者说反, 为错误选项。

14. D**题目解读****三种双单倍体植株产生途径的分析**

(1) 种间杂交: (母本) 多棱大麦×(父本) 球茎大麦, 受精卵中父本染色体逐渐消失, 剩余母本配子染色体, 经胚挽救技术成为单倍体植株, 再经秋水仙素处理成为双单倍体植株。

(2) 孤雌生殖: 雌配子($n=7$) 直接发育成单倍体植株, 再经秋水仙素处理成为双单倍体植株。

(3) 花粉处理: 花粉($n=7$) 经辐射或化学试剂等处理, 与正常雌配子杂交, 经胚挽救后用秋水仙素处理成为双单倍体植株。

核心逻辑: 单倍体($n=7$) → 秋水仙素抑制纺锤体的形成, 染色体数目加倍($2n=14$), 即双单倍体, 为纯合子。

【解析】 本题考查单倍体育种技术。

根据题干信息可知, 多棱大麦与球茎大麦杂交能形成受精卵, 说明两物种的配子可相互识别, **A 错误**; 配子染色体组成类型由非同源染色体自由组合决定, n 对同源染色体个体可产生的配子类型有 2^n 种, 大麦含有 7 对同源染色体, 故配子类型最多为 $2^7=128$ (种), 孤雌生殖途径产生的单倍体植株由雌配子直接发育而成, 只考虑染色体组成, 类型最多有 128 种, **B 错误**; 减数分裂存在基因重组, 配子基因型对应的表型可能与母本不同, **C 错误**; 单倍体经秋水仙素处理后, 形成纯合的双单倍体植株, 三条途径的单倍体加倍后均为纯合子, 可稳定遗传, **D 正确**。

知识拓展 胚挽救技术

胚挽救技术指对由于营养或者生理原因造成的难以播种成苗, 或者在发育早期阶段就败育或者退化的胚, 进行早期的分离培养成苗的过程。胚挽救技术包括子房培养、胚珠培养和胚培养。它将离体的子房、胚珠或胚在无菌的条件下放在人工制备的培养基上进行培养, 使其萌发长成植株。

15. B**题目解读**

雌雄同体 (XX): $xol-1$ 基因不表达 → DCC 与两条 X 染色体结合 → 抑制 X 染色体上相关基因表达; 雄性 (XO): $xol-1$ 基因表达 → 无 DCC 与 X 染色体结合 → X 染色体上相关基因正常表达。

【解析】 本题考查基因表达调控。

DCC 与 X 染色体结合后抑制 X 染色体上相关基因的表达, 并不会破坏基因结构 (注意: 基因结构被破坏的本质是基因的碱基序列改变), **A 错误**。 $xol-1$ 基因在雄性 (XO) 线虫中表达, 会阻止 DCC 的组装, 从而无 DCC 与 X 染色体结合, 若 $xol-1$ 基因突变, DCC 会结合雄性的 X 染色体, 抑制其上相关基因表达, 导致雄性相关基因表达量不足, 最终导致雄性线虫发育异常或死亡, **B 正确**。在雄性线虫中, $xol-1$ 基因表达会抑制 DCC 的组装, 而不是增强 DCC 的作用, **C 错误**。在雌雄同体 (XX) 线虫中, $xol-1$ 基因不表达, DCC 与两条 X 染色



体结合,基因表达水平较低,但总表达量为 100%;在雄性(XO)线虫中,*xol-1* 基因表达,抑制 DCC 的组装,从而无 DCC 与 X 染色体结合,X 染色体上相关基因表达水平较高,总表达量为 100%,说明该机制可减小雌雄同体和雄性线虫间 X 染色体上相关基因表达量的差异,**D 错误**。

16. B 【解析】本题考查异源多倍体培育。

林烟草染色体组成为 TT,含 2 个相同的 T 染色体组,每个染色体组均含 12 条形态不同的染色体,因此林烟草细胞中染色体共有 12 种形态,**A 正确**;低温抑制纺锤体的形成,影响染色体移向细胞两极,但不会影响着丝粒的正常分裂,最终会导致染色体数目加倍,**B 错误**;F₁ 植株染色体组成为 TS,无同源染色体,减数分裂时联会紊乱,不能产生正常配子,因此不具有正常繁殖能力,**C 正确**;栽培烟草(TTSS)共含 4 个染色体组,共 $12 \times 4 = 48$ (条)染色体,有 24 对同源染色体,减数分裂 I 前期,每对同源染色体联会形成 1 个四分体,因此可形成 24 个四分体,**D 正确**。

限时小卷 ▶ 4

1. D 【解析】本题考查同位素标记法。

探究分泌蛋白合成与分泌的过程时,用³H 标记亮氨酸的 R 基,R 基不参与缩合过程,可有效追踪分泌蛋白的合成、加工和运输路径,**A 正确**;鲁宾和卡门使用稳定同位素¹⁸O,分别标记 H₂O 和 CO₂,进行两组实验,H₂¹⁸O 和 CO₂ 供给植物产生¹⁸O₂,H₂O 和 C¹⁸O₂ 供给植物产生 O₂,自变量就是¹⁸O 标记的化合物类型,**B 正确**;³⁵S 标记的是 T2 噬菌体的蛋白质外壳,T2 噬菌体侵染细菌时只有 DNA 进入细菌,蛋白质外壳留在细菌外,离心后质量较轻的蛋白质外壳分布在上清液中,因此上清液放射性含量高,**C 正确**;¹⁵N 是稳定同位素,不具有放射性,验证 DNA 半保留复制实验利用的是¹⁵N 与¹⁴N 的相对原子质量差异,通过密度梯度离心区分不同密度的 DNA 分子,**D 错误**。

2. B 【解析】本题考查细胞器串扰。

细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,具有锚定并支撑细胞器、参与细胞内物质运输和信号传递等的功能,因此其在细胞器串扰(细胞器间的协调配合)中起到了关键作用,**A 正确**;细胞器串扰是指细胞内部不同结构之间的联系,细胞间的信息传递是指不同细胞之间进行的联系,二者范围不同,**B 错误**;内质网和高尔基体之间通过囊泡转运分泌蛋白等物质,属于细胞器间的物质交换,符合细胞器串扰的定义,**C 正确**;细胞器串扰可让不同细胞器协同配合,保障细胞代谢有序进行,不同功能的细胞中细胞器串扰的模式存在差异,是细胞功能特化的基础,**D 正确**。

3. D 【解析】本题考查酶促反应。

酶的作用是降低化学反应的活化能,**A 正确**;酶的活性受温度影响,高温会破坏酶的空间结构使其失活,因此该传感器需要在适宜温度下使用,**B 正确**;酶本身不参与化学反应,反应前后自身的性质、数量等都不变,因此 GOD 可以在该传感器中反复利用,**C 正确**;该传感器的反应速率受葡萄糖浓度、酶含量、温度等多种因素影响,并非仅与葡萄糖浓度有关,**D 错误**。

4. C 【解析】本题考查植物体细胞全能性分子机制。

细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,分化的气孔前体细胞发育为完整植株,体现了植物细胞的全能性,**A 正确**;由题干信息可知,气孔前体细胞在 *LEC2*、*SPCH* 基因协同作用下,可激活生长素合成相关基因,经染色质重塑,关闭气孔分化程序等,重编程为全能干细胞,该过程属于细胞脱分化过

程,即 *LEC2*、*SPCH* 基因可通过促进生长素合成推动脱分化过程,**B 正确**;根据题意,体细胞重编程过程中的染色质重塑属于表观遗传修饰,基因的碱基序列不变(常考:表观遗传的特点是①基因的碱基序列不变,②基因表达水平改变,③属于可遗传变异),**C 错误**;体细胞重编程过程中,会关闭气孔分化相关基因、激活胚胎发育程序,该过程存在基因的选择性表达,**D 正确**。

5. **C** 【解析】本题考查耐药性相关的膜转运蛋白。

根据实验结果分析可知,甲氨蝶呤进出细胞需要转运蛋白(RFC1 和 P-gp),题干信息无法确定该过程是否消耗能量或是否为逆浓度梯度运输,因此无法确定甲氨蝶呤进出肿瘤细胞的方式是主动运输还是协助扩散,**A、B 错误**。药物敏感型细胞 RFC1 的含量较高,说明 RFC1 可能介导甲氨蝶呤进入细胞;耐药型细胞 P-gp 含量较高,说明 P-gp 可能介导甲氨蝶呤排出细胞,二者都可能是转运甲氨蝶呤的载体蛋白,**C 正确**。由上述分析可知,抑制 RFC1 活性可能会减少甲氨蝶呤进入肿瘤细胞,反而会增强肿瘤耐药性,抑制 P-gp 活性可有效改善肿瘤耐药性,**D 错误**。

6. **D** 【解析】本题考查种群空间分布。

礁石上的成体藤壶活动能力弱、活动范围小,可采用样方法调查成体藤壶的密度(易错:取样器取样法适用于调查土壤小动物类群的丰富度),**A 错误**。潮间带分布上限的核心胁迫是缺水环境,根据题意,小藤壶成体耐受缺水环境能力较强,由大藤壶成体在潮间带的分布情况推测,大藤壶成体耐受缺水能力较弱,因此缺水环境是限制大藤壶成体分布上限的主要因素,**B 错误**。荔枝螺偏好捕食大藤壶,移除荔枝螺后,大藤壶被捕食压力下降,种群数量增加,可能会凭借种间竞争优势挤压小藤壶的生存空间,小藤壶分布面积可能会缩小,**C 错误**。藤壶幼虫营浮游生活,可随潮水扩散,因此分布范围更广;藤壶成体营固着生活,在适宜环境才能存活,因此分布范围小,**D 正确**。

7. **D**

题目解读

某二倍体昆虫的性别由性指数(受精卵的 X 染色体数与常染色体组数的比值)决定:性指数 ≥ 1 ,则发育成雌性;性指数 ≤ 0.5 ,则发育成雄性,雄性个体有 Y 染色体才可育。因此几种性染色体组成对应的性别如下:

	XY	XX	XXX	XXY	XO	XYY	OY
性指数	0.5	1	1.5	1	0.5	0.5	0
性别	雄性	雌性	雌性	雌性	雄性 (不育)	雄性	雄性

【解析】本题考查性指数决定性别的方式。


该二倍体昆虫的性别由性指数决定,即 X 染色体数和常染色体组数的比值,但不表示性染色体(X、Y)上的基因均与性别决定无关,**A 错误**;该二倍体昆虫的常染色体组数为 2,XXY 型昆虫性指数为 1,XXX 型的性指数为 1.5,则它们均发育成雌性,**B 错误**;XX 型昆虫产生的雌配子为 X,XO 型昆虫为不育雄性,无法产生正常雄配子,故它们杂交不能产生子代,**C 错误**;XX 型昆虫(雌性)与 XY 型昆虫(雄性)杂交,子代出现 XYY 型,最可能是因为父本减数分裂 II 时,Y 染色体的姐妹染色单体分离后移向细胞同一极,形成了含 YY 的精子,与含 X 的卵细胞结合形成受精卵,**D 正确**。



8. C

题目解读

② $a \sim b$: 根细胞呼吸释放 CO_2 , 说明会进行产生酒精的无氧呼吸, 且 $a \sim b$ 无氧呼吸产酒精的速率逐渐升高



① $0 \sim a$: 无 CO_2 释放, 说明此时根细胞进行的是产生乳酸的无氧呼吸

【解析】本题考查细胞呼吸。

根据题目解读可知, **A、B 正确**; 从 a 到 b 该幼苗根细胞内可能同时进行产生酒精的无氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸, 无氧呼吸无论产生酒精还是乳酸, 第一阶段都是相同的, 且只有第一阶段释放少量能量, 故从 a 到 b 该幼苗根细胞内相同质量的葡萄糖产生的 ATP 不会增多, **C 错误**; 酒精的跨膜运输方式是自由扩散, **D 正确**。

9. B 【解析】本题考查分级调节。

由题图可知, 下丘脑能够调控垂体, 进而调控肾上腺皮质分泌 GC, 构成下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的分级调节机制, 而 GC 过多会抑制下丘脑和垂体分泌相应激素, 属于负反馈调节, **A 正确**; 雾化吸入 GC 后, 体内 GC 含量增加, 会通过负反馈调节抑制自身 GC 分泌, **B 错误**; GC 属于激素, 需与靶细胞上的特异性受体结合发挥作用, **C 正确**; 长期高剂量使用雾化 GC, 会通过反馈调节使肾上腺皮质分泌的 GC 减少, 可能导致肾上腺皮质功能减退, 进而影响儿童发育等, **D 正确**。

10. D 【解析】本题考查细胞工程与基因工程。

题图中形成重组细胞④运用了体细胞核移植技术(即体细胞克隆技术), 体细胞核移植技术中接受供体细胞核的是发育到 M II 期的次级卵母细胞, **A 正确**; 重构胚⑤需要用物理或化学方法来激活(常考: 重构胚常用电刺激、 Ca^{2+} 载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂等激活), 使其完成细胞分裂和发育进程, **B 正确**; 题图中①为目的基因, 在目的基因(①)进入受体细胞(③)之前要用限制酶、DNA 连接酶、载体等来构建基因表达载体, **C 正确**; ④重组细胞中检测到人血清白蛋白基因, 说明目的基因已导入受体细胞中, 但不一定完成了表达, 只有检测到人血清白蛋白才能说明目的基因在受体细胞中完成了表达, **D 错误**。

11. A 【解析】本题考查协同进化。

豆丁海马利用柳珊瑚分泌物抵御病原体, 这是一种借助外部资源的防御机制, 并不是使其丢失免疫相关基因序列的原因, 题图中豆丁海马仍有免疫相关基因的波峰(存在免疫相关基因), 只是与题图中其他物种的基因序列相似度较低, **A 错误**; 波峰高度越接近表示基因序列相似度越高, 相似度越高说明亲缘关系越近, 分化时间越晚, 与豆丁海马相比, 题图中虎尾海马和日本海马的基因序列相似度更高, 说明它们的亲缘关系更近, 出现生殖隔离的时间可能更晚, **B 正确**; 在进化过程中, 由于自然选择、突变、基因重组等因素, 四种海龙科生物各自的种群基因库均会不断发生变化, **C 正确**; 豆丁海马的拟态特征是长期与柳珊瑚及周围海洋环境间协同进化的结果, 有利于豆丁海马更好地生存, **D 正确**。

12. C 【解析】本题考查肿瘤坏死因子的信号通路。

肿瘤坏死因子(TNF)属于细胞因子, 可由免疫细胞产生, **A**



正确；树突状细胞属于抗原呈递细胞，识别抗原后能够将抗原信息呈递给辅助性 T 细胞，参与特异性免疫（**要点：特异性免疫的启动依赖抗原呈递细胞**），**B 正确**；Tnfr1 敲除小鼠肿瘤体积在 35 天内持续小于野生型和 Tnfr2 敲除小鼠，可推测 TNF 主要通过 Tnfr1 信号通路促进胰腺肿瘤生长，故设计阻断 Tnfr1 与 TNF 结合的药物，可阻断信号通路，抑制胰腺肿瘤生长，可作为一种治疗思路，**C 错误，D 正确**。

13. C 【解析】本题考查 DNA 复制的过程。

由题图可知，引物酶以 DNA 为模板合成 RNA 引物，属于一种 RNA 聚合酶，能将游离的核糖核苷酸连接成 RNA 链（**要点：明确引物酶的作用是合成 RNA 引物，为 DNA 复制的启动做准备**），**A 正确**；PCR 中 1 个 DNA 复制需要 2 个引物分别与两条模板链结合，细胞内 DNA 复制因后随链的合成是不连续的，需多个引物，**B 正确**；细胞内 DNA 复制需 Mg^{2+} 激活 DNA 聚合酶，故 PCR 反应体系中应加入一定量的 Mg^{2+} ，而非 Ca^{2+} ，**C 错误**；PCR 常用人工合成的短单链 DNA 作引物，**D 正确**。

14. A 【解析】本题考查微生物筛选技术。

在筛选淀粉酶高产菌株的过程中，先把单菌落接种到 96 孔板中培养，培养一段时间后在每个孔中加入可溶性淀粉，目的是筛选出淀粉酶产量高的菌株，相当于鉴别培养基，即淀粉不是唯一的碳源，**A 错误**；根据题图信息，实验流程中每个孔中接入的是“每个纯化的单菌落”，接种的初始微生物的数量属于无关变量，需要保持一致，**B 正确**；根据题意，吸光值大小与溶液蓝色深浅呈正相关，吸光值越大，溶液蓝色越深，说明剩余的淀粉越多，对应菌株的淀粉酶产量越低，反之，吸光值越小，说明淀粉被分解得越多，菌株的淀粉酶产量越高，因此吸光值最小的孔中的菌株为目的菌株，**C 正确**；高通量筛选技术可以同时大量候选菌株进行检测，大幅提高筛选效率，**D 正确**。

15. C

题目解读

(1) 题图中，正常状态时 LHb 神经元胞体的 NMDAR、T 型钙通道关闭， Ca^{2+} 内流少，表现为单个放电，输出正常，不对下游“奖赏”脑区过度抑制。

(2) 抑郁状态时，压力、消极等刺激使 NMDAR、T 型钙通道开放， Ca^{2+} 大量内流，引发簇状放电，即连续高频的动作电位，输出增强，过度抑制下游“奖赏”脑区，导致产生抑郁情绪。

(3) 氯胺酮能够抑制 NMDAR、T 型钙通道，使 Ca^{2+} 内流减少，恢复单个放电和正常输出，解除对下游“奖赏”脑区的过度抑制，以达到抗抑郁作用。


【解析】本题考查神经元动作电位。

抑郁状态下，LHb 神经元是簇状放电，即连续高频的动作电位，正常状态下是单个放电，故抑郁症患者的 LHb 神经元的放电频率比正常人高，**A 错误**；反射的结构基础是完整的反射弧，即感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器，抑郁是大脑皮层产生的情绪，未经过完整的反射弧，不属于反射，**B 错误**；由题图可知，氯胺酮能够抑制 NMDAR 和 T 型钙通道，减少 Ca^{2+} 内流，恢复单个放电，解除对下游“奖赏”脑区的过度抑制，以达到抗抑郁的作用，**C 正确**；长期服用氯胺酮可能导致 NMDAR 和 T 型钙通道对氯胺酮的敏感性降低，故不能长期服用氯胺酮预防抑郁症，**D 错误**。


题目解读

第一步:结合电泳结果和染色体结构图,分析进行性假肥大性肌营养不良(DMD)发病的机理。

DMD 基因正常和基因异常结果如图:



倒位, 变成致病基因



第二步:遗传方式的判断。表型正常的夫妇生育了患DMD 的儿子,说明该病为隐性遗传病,电泳结果显示,父亲全为正常基因扩增的条带,说明父亲没有致病基因,而其儿子含有致病基因,因此该病为伴 X 染色体隐性遗传病。

【解析】本题考查遗传病 PCR 检测。

根据上述分析可知,DMD 基因和 HS6S12 基因位于 X 染色体上,A 正确。正常 DMD 和 HS6S12 基因仅能被引物组合②③扩增出条带,而患儿的异常基因能被引物组合①④扩增出条带,这说明 DMD 基因区域与 HS6S12 基因区域发生了染色体结构变异,导致引物组合①④能扩增出产物,B 正确。设相关基因用 A/a 表示,母亲为携带者($X^A X^a$),父亲

基因型为 $X^A Y$,女儿基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^A X^A$ 、 $\frac{1}{2}X^A X^a$,引

物组合④仅能扩增出异常 X 基因,若女儿携带致病基因,则用引物组合④可扩增出条带,若不携带致病基因则用引物组合④不能扩增出条带,因此可用引物组合④进行 PCR 检测女儿是否携带致病基因,C 正确。女儿基因型及概率为

$\frac{1}{2}X^A X^A$ 、 $\frac{1}{2}X^A X^a$,已知 DMD 在男性中发病率为 p ,即人群中

X^a 的基因频率为 p , X^A 的基因频率为 $(1-p)$,若女儿基因型为 $X^A X^A$,与任何男性婚配,子代均不患病,概率为 0;若

女儿基因型为 $X^A X^a$ (概率为 $\frac{1}{2}$),与正常男性($X^A Y$,概率

为 $1-p$)婚配,子代患病概率为 $\frac{1}{4}$ (仅儿子 $X^a Y$ 患病),与患

病男性($X^a Y$,概率为 p)婚配,子代患病概率为 $\frac{1}{2}$ (女儿

$X^a X^a$ 、儿子 $X^a Y$ 患病),故女儿婚后生育一个患有 DMD 的

子代的概率是 $\frac{1}{2} \times \left[(1-p) \times \frac{1}{4} + p \times \frac{1}{2} \right] = \frac{1+p}{8}$,D 错误。