



小卷提速 · 提分

提分小卷 ▶ 1


1. **D** 【解析】本题考查细胞的结构和功能。

细胞膜上的糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系,故糖被除了作为受体的作用之外,也可能是信号分子,**A 错误**;神经细胞的突起分为轴突和树突,其中轴突将信息从胞体传向其他神经元、肌肉或腺体,而树突是用来接收信息并将其传导到胞体的,**B 错误**;人体细胞进行有氧呼吸产生 CO_2 的场所是线粒体基质,植物细胞中进行光合作用产生 O_2 的场所是叶绿体的类囊体薄膜,而过氧化物酶体在植物细胞中普遍存在,其中的过氧化氢酶可以通过催化过氧化氢分解产生 O_2 ,**C 错误**;细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,**D 正确**。

2. **C** 【解析】本题考查植物缺素诊断。

实验中 A 组施用 NH_4NO_3 溶液(含 N 不含 Mg)、B 组施用 MgSO_4 溶液(含 Mg 不含 N)、C 组施用 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 溶液(同时含 N 和 Mg),一段时间后观察不同组玉米幼苗叶片的颜色变化,目的是探究叶片发黄的原因是缺少 N、缺少 Mg,还是同时缺少 N 和 Mg,**A 正确**;无关变量是指实验中除自变量以外影响实验结果的变量,本实验中自变量是所施溶液的种类(即元素的种类),三组幼苗的数量及三种溶液的浓度等对实验结果有影响,但不是本实验要研究的变量,属于无关变量,应保持相同且适宜,**B 正确**;若 A、B 两组叶片发黄,C 组叶片变绿,即 A 组仅含 N 发黄,B 组仅含 Mg 发黄,C 组同时含 N 和 Mg 变绿,这表明叶片发黄的原因是缺少 N 和缺少 Mg,而不是缺少 N 或缺少 Mg,**C 错误**;单一变量原则是指实验中只改变了一个变量,本实验的变量是所施溶液的种类(即元素种类),其他条件相同且适宜,遵循了单一变量原则,本实验设置了不同组相互对照,遵循了对照原则,**D 正确**。

要点归纳 (1) 高中生物学实验题的分析体系



(2) 实验结果的分析

① 单自变量结果分析

如果题目中自变量只有一个,则直接根据实验结果推理出结果和结论的逻辑关系。

② 多自变量结果分析

若题目中具有多个自变量,同时对一个因变量产生影响,在分析自变量对因变量的影响时,需要注意单一变量原则,使其他变量保持一致,分析某一变量。

③ 定量实验结果分析

在定量实验的结果分析中,不仅需要注意分析自变量对因变量的定性影响,还需要分析自变量和因变量之间的定量关系,即两者在一定范围之内的数据相关性。

3. **D** 【解析】本题考查酶与 ATP 的转化。

ATP 分子的结构可以简写为 $\text{A}-\text{P} \sim \text{P} \sim \text{P}$,AMP 分子的结构

可以简写为 A—P,二者都含有腺苷(A)和磷酸基团,ATP 水解脱去两个磷酸基团后成为 AMP,AMP 是 RNA 的基本单位,**A 错误**;正常细胞内,ATP 与 ADP 之间的相互转化时刻不停地发生并且处于动态平衡之中,ATP 在细胞中含量较少,**B 错误**;AMP 脱氨酶、ACP、酶 X 等酶的作用机制是降低化学反应的活化能,不为化学反应提供活化能,**C 错误**;IMP 具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜味,故在 IMP 降解前有效抑制 ACP 的活性能减少 IMP 的降解,使鱼肉保持鲜味,**D 正确**。

4. **C** 【解析】本题考查 Ca^{2+} 的跨膜运输。

Ca^{2+} 通过 ECA 进入内质网,通过 CAX 借助 H^+ 梯度进入液泡,都属于主动运输,主动运输是逆浓度梯度运输,说明内质网和液泡内的 Ca^{2+} 浓度高于细胞质基质,**A 错误**;敲除 ECA 基因(仅存液泡回收途径)的突变体甲恢复时间为 240 s,敲除 CAX 基因(仅存内质网回收途径)的突变体乙恢复时间为 200 s,说明缺失内质网途径对 Ca^{2+} 回收的影响更大,内质网的作用更显著,**B 错误**;冷激时细胞质基质 Ca^{2+} 浓度快速升高,与内质网、液泡中的 Ca^{2+} 通过膜上 Ca^{2+} 通道顺浓度梯度释放到细胞质基质中有关,抑制二者膜上的 Ca^{2+} 通道会减少 Ca^{2+} 的释放量,冷激后细胞质基质中 Ca^{2+} 峰值会降低,**C 正确**;突变体甲的 ECA 基因被敲除,只能依靠液泡回收途径回收 Ca^{2+} ,CAX 依赖液泡膜两侧的 H^+ 浓度差工作,而 H^+ 浓度差由液泡膜 ATP 酶主动运输 H^+ 进入液泡建立,抑制液泡膜 ATP 酶活性会导致 H^+ 梯度无法正常建立,CAX 无法正常转运 Ca^{2+} ,突变体甲的恢复时间会延长,**D 错误**。

知识拓展

植物细胞中 Ca^{2+} 作为第二信使参与信号转导。细胞质基质 Ca^{2+} 浓度通常维持在较低水平,远低于细胞外和细胞器内的浓度。当受到逆境胁迫(如冷激、干旱、盐胁迫)时, Ca^{2+} 通过通道蛋白从内质网、液泡等钙库快速释放至细胞质基质,引起细胞质基质 Ca^{2+} 浓度瞬时升高,激活下游信号通路。随后通过 Ca^{2+} -ATP 酶和 $\text{Ca}^{2+}/\text{H}^+$ 反向转运体将 Ca^{2+} 回收至钙库,恢复静息水平。这种“释放—回收”机制是植物响应环境胁迫的重要基础。

5. **C**

题目解读

b点:叶面积指数为b时,群体光合速率达到最大值




图1

a点:群体干物质积累速率达到最大,叶面积指数大于a后,群体干物质积累速率下降

CO_2 吸收速率代表植物叶片净光合速率




图2

呼吸速率:甲>乙

c点: CO_2 吸收速率=0,即净光合速率为0,植物叶片呼吸速率=光合速率



【解析】本题考查叶面积指数。

由题目解读可知,当叶面积指数小于 a 时,随叶面积指数增加,群体干物质积累速率上升,当叶面积指数大于 a 时,随叶面积指数增加,群体干物质积累速率下降,据此可以看出过度密植可能会导致产量下降,因而相关研究对合理密植具有重要指导意义,**A 正确**;题图 2 中 c 点时,甲、乙两种叶片的净光合速率相等且均为零,此时叶片的光合速率=呼吸速率,但由于甲、乙两种叶片的呼吸速率不同,所以光合速率,即 CO_2 固定速率不同,**B 正确**;当叶面积指数大于 a 时,群体干物质积累速率下降,因此题图 1 中 $a \sim b$ 段群体光合速率增加量小于群体呼吸速率增加量,**C 错误**;由于上层叶片对阳光有遮挡,导致下层叶片接受的光照强度较弱,因此下层叶片净光合速率达到最大值时所需要的光照强度较上层叶片的低,因此据题图 2 推测,甲种叶片位于树冠上层,且甲种叶片净光合速率最大时所需光照强度高于乙,**D 正确**。

6. **C** **【解析】**本题考查模拟实验。

绿豆和黄豆的形状等物理性质差异明显,抓取时无法保证 D、d 两种配子被抓取的概率相等,不能代替质地相同的彩球,**A 错误**;着丝粒分裂不是由纺锤丝牵引导致的,牵拉细绳使橡皮泥分开仅能模拟纺锤丝牵引染色体移向细胞两极的过程,**B 错误**;构建重组 DNA 分子时两个 DNA 片段需要通过形成磷酸二酯键实现连接,用订书钉连接两个带有 DNA 序列的纸条,可模拟磷酸二酯键的形成过程,**C 正确**;两对等位基因的自由组合需要模拟非同源染色体上非等位基因的自由组合,需设置两个小桶分别代表两对同源染色体,各装入表示一对等位基因的彩球,每次从两个桶各抓取一个彩球模拟自由组合,仅向实验一的桶内加入代表另一对等位基因的彩球,无法模拟两对等位基因自由组合的过程,**D 错误**。

7. **D**

题目解读

依据实验一,黄色母鸭(甲) $\times$ 灰色公鸭(乙) $\rightarrow$ 母鸭全为灰色,公鸭全为褐色,由于褐色需要同时具有 A 和 B 基因,灰色需要有 A 基因无 B 基因,结合鸭子的性别决定方式可推知 A/a 基因位于常染色体上,B/b 基因位于 Z 染色体上。

【解析】本题考查基因互作与遗传。

依据题目解读可知,B/b 基因位于 Z 染色体上,甲、乙基因型分别为 $\text{aaZ}^{\text{B}}\text{W}$ 、 $\text{AAZ}^{\text{b}}\text{Z}^{\text{b}}$,丙的基因型为 $\text{aaZ}^{\text{b}}\text{W}$,**A、C 正确**;甲、乙、丙的基因型分别为 $\text{aaZ}^{\text{B}}\text{W}$ 、 $\text{AAZ}^{\text{b}}\text{Z}^{\text{b}}$ 、 $\text{aaZ}^{\text{b}}\text{W}$,实验一中 F_1 基因型为 $\text{AaZ}^{\text{B}}\text{Z}^{\text{b}}$ (公鸭)、 $\text{AaZ}^{\text{b}}\text{W}$ (母鸭),实验二中 F_1 基因型为 $\text{AaZ}^{\text{b}}\text{Z}^{\text{b}}$ (公鸭)、 $\text{AaZ}^{\text{b}}\text{W}$ (母鸭),均为杂合子,**B 正确**;实验三亲本基因型为 $\text{AaZ}^{\text{B}}\text{Z}^{\text{b}}$ 、 $\text{AaZ}^{\text{b}}\text{W}$,后代白色公鸭基因型为 $\text{aaZ}^{\text{b}}\text{Z}^{\text{b}}$,分别讨论两对基因, $\text{Aa} \times \text{Aa}$ 得到 aa 的概率为 $\frac{1}{4}$,公鸭中 $\text{Z}^{\text{b}}\text{Z}^{\text{b}}$ 的概率为 $\frac{1}{2}$,总概率为 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$,**D 错误**。

8. **C** **【解析】**本题考查 RNA 干扰机制。

由题干及题图可知,转录激活因子 TAZ 可以促进 miR-29a




(一种小分子 RNA) 的合成, 即提高 *miR-29a* 基因的转录水平, **A 正确**; 由题图可知, *miR-29a* 与 *GALNT18* mRNA 通过碱基互补配对进行识别, **B 正确**; 由题图可知, *miR-29a* 与 *GALNT18* mRNA 结合后导致其降解, 是在翻译水平上调控 *GALNT18* 的功能 (注意: mRNA 是翻译的模板, *miR-29a* 通过影响 mRNA 的翻译过程进而影响基因功能), **C 错误**; 由题干及题图可知, TAZ 通过抑制 *GALNT18* 的表达, 减少小细胞肺癌细胞 O-糖基化修饰进而抑制其转移, 故可推知 *GALNT18* 高表达会促进小细胞肺癌细胞的转移, **D 正确**。

9. **C** 【解析】本题考查体温调节。

肾上腺素能促进物质氧化分解, 使产热增加, 所以寒冷环境中, 交感—肾上腺髓质系统会参与应激反应, 肾上腺素分泌增加, **A 正确**; 出现失温的原因是人体长时间处于热量流失大于热量补给的状态, 导致体温下降, 所以夏季运动时若遇气温骤降, 使热量流失大于热量补给, 也可能会发生失温现象, **B 正确**; 轻度失温过程中, 身体发抖会使产热增多, 此时产热量仍小于散热量, 体温降低, **C 错误**; 重度失温时, 患者会有燥热以及反常脱衣现象, 说明皮肤冷觉感受器失灵, 下丘脑的体温调节功能异常, **D 正确**。

要点归纳 体温调节的过程



10. **A**

题目解读

据题图可知, 降低 $\gamma 4$ 神经元膜上 Nlg3 的含量, 果蝇运动速度下降; 阻断谷氨酸的释放, 果蝇运动速度更慢, 说明 Nlg3 可能与谷氨酸的释放有关。

【解析】本题考查突触结构与功能。

实验组 1 和实验组 2 采用两种不同的基因操作技术, 均特异性地降低果蝇 $\gamma 4$ 神经元膜上 Nlg3 的含量, 得到了相似的实验结果, 这可以排除单一基因操作技术影响其他神经元造成的假阳性, 保证实验结果是由 Nlg3 含量降低导致的, **A 正确**; Nlg3 是突触后膜的黏附分子, 其减少不会导致 $\gamma 4$ 神经元无法合成谷氨酸, **B 错误**; Nlg3 是突触后膜的黏附分子, 功能是稳定突触结构, 参与保障神经信号正常传递, 并非谷氨酸的受体, 谷氨酸需与突触后膜上的特异性受体结合, 才能引发突触后膜兴奋, **C 错误**; Nlg3 是位于突触后膜的黏附分子, 该实验不能证明其为 $\gamma 4$ 神经元特有的蛋白质, **D 错误**。

11. **D** 【解析】本题考查种子休眠调控机制。

由题意可知, 在种子萌发过程中, ABA 促进种子休眠, GA 抑制种子休眠, 二者作用相抗衡, **A 错误**; 流水浸种有利于种

子萌发的原因是降低了种子中脱落酸的含量，**B 错误**；光敏色素分布于植物的各个部位，**C 错误**；人为控制环境条件能够调控基因的表达过程，从而改变激素的相对含量，**D 正确**。

12. D 【解析】本题考查自然选择与生物进化。

基因突变具有不定向性，不同类型的猎物只起到选择作用，不会诱导高山麝鼩发生定向基因突变，吻部形态差异是不定向基因突变后经环境选择保留的结果，**A 错误**；种群的年龄结构是指一个种群中各年龄期个体数目的比例，甲、乙是按觅食特征划分的亚群，二者的数量变化不能直接决定该种群的年龄结构，**B 错误**；生殖隔离是新物种形成的标志，甲、乙属于同一种群的两个亚群，不存在生殖隔离，没有进化为两个新物种，**C 错误**；自然选择会定向改变种群的基因频率，决定生物进化的方向，气候暖化后岩缝昆虫幼虫增多，更适合甲亚群生存，因此甲亚群数量占比上升是自然选择定向作用下种群基因频率定向改变的结果，**D 正确**。

易错总结 生物进化中的“定向”与“不定向”

(1) 基因突变是不定向的：环境或猎物的差异不能“诱导”生物产生定向基因突变，基因突变是随机发生的；自然选择只是对已经产生的各种基因突变控制的性状进行筛选，而不是决定基因突变的方向。

(2) 自然选择是定向的：特定环境会定向保留适应环境的性状，导致种群中相应基因频率定向改变，从而决定生物进化的方向。

(3) 快速判断技巧：若选项表述为“环境诱导定向突变”“环境使生物发生定向变异”等，通常判断为错误；若表述为“自然选择使种群基因频率定向改变”，则判断为正确。

13. B 【解析】本题考查生态系统碳循环。

增加土壤碳固存，可减少 CO_2 排放，在一定程度上有利于缓解温室效应，**A 正确**；取样器取样法可调查土壤中小动物类群的丰富度，不能用于调查微生物类群的丰富度，**B 错误**；土壤有机碳增加可提高土壤肥力、改善土壤结构，有利于作物生长，**C 正确**；绿肥和牛粪属于有机物质的输入，可改善土壤微生物群落结构，促进物质循环，**D 正确**。

要点归纳 生物丰富度常用调查方法

(1) 稀释涂布平板法：适用于微生物（细菌、真菌等），通过鉴定菌落种类推算微生物类群的丰富度。

(2) 取样器取样法：适用于土壤中小动物，用诱虫器分离后统计物种数。

(3) 样方法：适用于活动能力弱、活动范围小的动物等。

14. B 【解析】本题考查药敏试验原理。

利用固体培养基培养微生物时，应将平板倒置，如题图 1 中的①，**A 错误**；IV 号滤纸片周围的抑菌圈中出现了菌落，说明这些菌落获得了抗药性，抗药性的获得可能是由于这些大肠杆菌发生了基因突变，**B 正确**；题图 2 中 IV 号纸片的抑菌圈中的菌落具有链霉素抗性，但不一定有四环素抗性，若将链霉素换成四环素进行题述实验，IV 号滤纸片周围的区域可能不会出现相应的菌落，**C 错误**；在题图实验中需将菌液均匀涂在固体培养基上，因此应用稀释涂布平板法接种微生物，**D 错误**。



15. C

题目解读

实验目的是提高甜菜的光合效率和产量,则应将目的基因插入“启动子(Mav35S)→多克隆位点→终止子”之间。

【解析】本题考查农杆菌转化法。

结合题图中启动子、终止子和限制酶酶切位点的位置可知,质粒上的酶切位点 *Hind* III 更靠近启动子(上游), *Aar* I 更靠近终止子(下游),因此,应该在 *SBPase* 基因上游添加 *Hind* III 序列,下游添加 *Aar* I 序列,才能保证目的基因插入方向正确, **A 错误**。农杆菌转化法中,只有质粒上的 T-DNA 区域会被整合到受体细胞的染色体 DNA 中,潮霉素抗性基因(*Hyg^R*)位于 T-DNA 内部,会随目的基因一起被整合到受体细胞染色体 DNA 上,卡那霉素抗性基因(*Kan^R*)位于 T-DNA 外部,不会被整合到受体细胞染色体 DNA 上。因此,筛选转基因甜菜细胞时,应使用含潮霉素的培养基, **B 错误**。凝胶电泳中, DNA 分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA 分子片段大小和构象等有关, **C 正确**。该过程是将拟南芥的 *SBPase* 基因转入甜菜,属于基因工程,并没有对蛋白质的结构进行设计改造,不属于蛋白质工程, **D 错误**。

16. BC

题目解读

该实验中自变量是植株类型及 Cd^{2+} 浓度,因变量为可溶性蛋白含量和丙二醛含量。由题图可知,随着 Cd^{2+} 浓度增大,三种苔藓的可溶性蛋白含量均先升高后降低,相同 Cd^{2+} 浓度处理下,除 Cd^{2+} 浓度为 $0 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 外,东亚砂藓的丙二醛含量为三者中最高的。

【解析】本题考查镉胁迫。

可溶性蛋白是细胞中的溶质,其含量升高会使细胞渗透压升高,使细胞对水的吸引力增强, **A 正确**;由题图 1 可知,随 Cd^{2+} 浓度升高,三种苔藓的可溶性蛋白含量均先升高后降低,细胞渗透压与可溶性蛋白含量相关,因此苔藓细胞渗透压不会随土壤 Cd^{2+} 浓度升高而不断升高, **B 错误**;丙二醛含量越高代表生物膜受损程度越重,相同 Cd^{2+} 浓度处理下,除 Cd^{2+} 浓度为 $0 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 外,东亚砂藓的丙二醛含量为三者中最高的,说明其细胞结构受损程度最大, **C 错误**;当 Cd^{2+} 浓度较低时,三种苔藓的可溶性蛋白含量均高于无 Cd^{2+} 的对照组,说明三者均可通过调节自身代谢应对镉胁迫,表现出一定的耐受性, **D 正确**。

17. A 【解析】本题考查突变与进化。

Ds 从原位置切下时,需要断裂 4 个磷酸二酯键,插入 C 基因内部时, C 基因的 DNA 双链断开,又断裂 2 个磷酸二酯键,即至少需要断裂 6 个磷酸二酯键, **A 错误**。若 Ds 转座到 C 基因, C 基因功能丧失,但发生题图 2 所示的过程后会使得 C 基因功能丧失后又恢复,据此推测,籽粒发育过程中的部分细胞发生题图 2 所示过程会导致紫色斑点出现, **B 正确**。若受精卵发生题图 1 所示过程,该受精卵(基因型为 *cOshOwxO*, O 表示缺失基因)将来发育成完整植株,表型为籽粒无色、凹陷、非蜡质, **C 正确**。根据题干和题图可知, *Ac/Ds* 系统提高了突变的频率,进而为生物进化提供了更加丰富的原材料, **D 正确**。

18. BCD 【解析】本题考查神经调节。

神经元产生兴奋,即形成动作电位时, Na^{+} 通过协助扩散的



方式内流,不消耗 ATP, **A 正确**;条件反射需要完整的反射弧参与,该过程仅大脑皮层产生神经信号,经微电脑转化为指令控制电动假肢,信息传递未经过完整的反射弧,不属于反射, **B 错误**;控制躯体运动的中枢位于大脑皮层第一运动区(中央前回),而大脑皮层言语区是调节语言活动的中枢,因此微电极阵列采集的神经信号不来自大脑皮层言语区, **C 错误**;微电脑将神经信号(电信号)转化为控制电动假肢的计算机命令,而反射弧中感受器的信号转换是外界刺激→电信号,二者类型不同, **D 错误**。

**30 s 速解**

中国科学技术大学 王炯涵

学霸说:新技术情境题要把“像什么”与“是什么”分开。脑机接口虽然利用了神经信号,但不等于形成了完整反射弧;计算机进行信号转化也不等于感受器把刺激转成神经信号。

患者靠“意念”驱动假肢,信息是从大脑皮层运动相关区域输出到设备,并没有通过完整反射弧,所以 B、C 错误;微电脑把电信号转化成控制指令,方向上不同于感受器把外界刺激转成神经冲动, D 错误。

19. BCD 【解析】本题考查能量流动。

某一营养级用于自身生长、发育和繁殖的能量=同化量-呼吸作用散失的能量,第Ⅳ营养级用于自身生长、发育和繁殖的能量是 $14.49 - 8.242 = 6.248 (\text{t} \cdot \text{km}^{-2} \cdot \text{a}^{-1})$, **A 正确**;生态系统的能量流动是单向流动、逐级递减的,不能循环利用,第Ⅱ营养级流向碎屑的能量会被分解者利用,大部分以热能形式散失,无法被循环利用, **B 错误**;能量传递效率是相邻两个营养级之间同化量的比值,第Ⅱ到第Ⅲ营养级的能量传递效率 $= 142.4 \div (835.7 + 671.2) \times 100\% \approx 9.45\%$,第Ⅲ到第Ⅳ营养级的能量传递效率 $= 14.49 \div 142.4 \times 100\% \approx 10.18\%$,即第Ⅱ到第Ⅲ营养级的能量传递效率低于第Ⅲ到第Ⅳ营养级的, **C 错误**;生态系统的营养级数量与物种丰富度没有直接关系,能量在沿食物链传递时,每一营养级都会因呼吸作用消耗掉大部分能量,因此通常一条食物链不超过 5 个营养级, **D 错误**。

20. BD 【解析】本题考查动物细胞培养。

若培养 iPS 细胞的培养基先添加血清再灭菌会破坏血清的成分, **A 错误**;为了确定 4 种基因在此过程中的作用,依次去掉 1 个基因,利用了减法原理, **B 正确**;成纤维细胞是已分化的细胞,不具有全能性, **C 错误**;已经分化的 T 细胞、B 细胞也能被诱导成 iPS 细胞, **D 正确**。

要点归纳 动物细胞培养的条件

(1) 无菌、无毒的环境:①消毒、灭菌;②添加一定量的抗生素;③定期更换培养液,以清除代谢废物。

(2) 营养:在添加细胞所需的各种营养物质的基础上添加血清。

(3) 温度和 pH:哺乳动物多以 $(36.5 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 为宜,适宜 pH 为 7.2~7.4。

(4) 气体环境:95%空气和 5%CO₂ 的混合气体。

提分小卷 ▶ 2

1. A 【解析】本题考查元素与化合物。

淀粉属于多糖,是生物大分子,无法直接被人体细胞吸收,需要水解为单糖后才能被吸收,**A 正确**;人体体液中的无机盐大多数以离子形式存在(常考:组成细胞的元素多以化合物的形式存在,无机盐多以离子的形式存在),**B 错误**;牛肉中的蛋白质为生物大分子,需要经消化系统分解为氨基酸后才能被人体吸收,无法直接被人体吸收用于肌肉修复,**C 错误**;铁属于微量元素,是血红蛋白的组成成分,参与氧气运输,**D 错误**。

2. D 【解析】本题考查植物细胞质壁分离。

在“探究植物细胞的吸水和失水”实验过程中,实验自身前后形成对照,不需要单独设置对照组,**A 错误**;完成步骤①(制作临时装片)时应用镊子夹起盖玻片,让它的一侧先接触载玻片上的液滴,然后缓缓放平,不能用手直接拿盖玻片放上,**B 错误**;步骤④可观察到细胞发生质壁分离,步骤⑥可观察到细胞发生质壁分离复原,由于质壁分离复原时细胞会吸水,液泡内细胞液浓度降低,所以会观察到步骤⑥液泡颜色比步骤④更浅,**C 错误**;步骤③到⑥过程中,细胞先发生质壁分离(细胞失水,细胞液浓度增大,吸水能力上升),后发生质壁分离复原(细胞吸水,细胞液浓度减小,吸水能力下降),即植物细胞吸水能力先上升后下降,**D 正确**。

要点归纳

探究植物细胞的吸水和失水实验中,需要注意两点:①实验中前后自身对照;②该实验是高中生物学观察类实验中唯一一个可以只用低倍镜观察的实验。

3. D 【解析】本题考查延缓细胞衰老的机制。

有氧呼吸第一、二阶段均会生成 NADH ,并合成少量 ATP , NADH 的消耗在有氧呼吸的第三阶段,该阶段 NADH 转化为 NAD^+ 且通常伴随 O_2 的消耗和 ATP 的合成, ATP 的合成消耗磷酸,**A、B 错误**;根据题意可知 SIRT1 激活程度与 $\frac{\text{NAD}^+}{\text{NADH}}$ 的值呈正相关,增加 NADH 相对含量, $\frac{\text{NAD}^+}{\text{NADH}}$ 的值会减小,则 SIRT1 激活程度会降低,延缓细胞衰老的作用就会减弱,所以调整饮食增加 NADH 相对含量,不可以延缓衰老,**C 错误**;根据题意可知 SIRT1 激活程度与 $\frac{\text{NAD}^+}{\text{NADH}}$ 的值呈正相关,增加 NAD^+ 相对含量, $\frac{\text{NAD}^+}{\text{NADH}}$ 的值会变大,则 SIRT1 激活程度会增加,延缓细胞衰老的作用就会增强,所以适度寒冷增加 NAD^+ 相对含量,可以延缓衰老,**D 正确**。

**要点归纳** 构建知识逻辑链的解题方法与步骤**(1) 构建主链**


构建逻辑主链的首要任务是仔细阅读题干,找出关键词,并通过箭头将它们连接起来。箭头上需要标注条件和相关性,使用“+”表示正相关,“-”表示负相关。如该题的主链可构建为:

$\frac{\text{NAD}^+}{\text{NADH}}$ 的值 $\xrightarrow{+}$ SIRT1 激活 $\xrightarrow{-}$ 细胞衰老

(2) 补充支链

支链的补充则是在主链的基础上,结合题目中的其他信息,进一步完善逻辑链。

该题的支链构建为:

**4. D 【解析】** 本题考查细胞分裂。

斑马鱼是真核生物,幼鱼表面上皮细胞(SEC)能在 DNA 不复制的情况下进行“无复制分裂”,而无丝分裂是指分裂过程中无染色体和纺锤丝的变化,会进行 DNA 复制,**A 错误**;同源染色体非姐妹染色单体间的互换通常发生在减数分裂过程中,而“无复制分裂”不涉及 DNA 复制和基因重组,故不会发生上述现象,**B 错误**;细胞核的全能性是指已分化细胞的细胞核仍然包含该生物全套的遗传物质,具有发育为完整个体或分化成其他各种细胞的潜能,“无复制分裂”产生的 4 个子 SEC 的细胞核不含该生物($2N=50$)全套的遗传物质,故其细胞核不具有全能性,**C 错误**;由于“无复制分裂”过程中核 DNA 不复制,每轮分裂后子细胞的核 DNA 含量减半,经过两轮分裂后,子细胞的核 DNA 含量可能不足以支持进一步的分裂,**D 正确**。

5. B 【解析】 本题考查基因自由组合定律。

①AABBCC 和②AABBcc 杂交, F_1 基因型为 AABBCc,仅 C/c 为杂合,B/b 为纯合,无论 B/b 与 C/c 是否连锁, F_1 自交后代均为黄色:绿色=3:1,无法判断基因位置,**A 错误**。
②AABBcc 和③AAbbcc 杂交, F_1 基因型为 AABbCc,A 基因纯合,仅需考虑 B/b、C/c 基因,若两对基因位于两对同源染色体上, F_1 自交后代黄色:绿色=9:7;若两对基因位于一对同源染色体上, F_1 自交后代黄色:绿色=1:1,可通过后代代表型及比例判断基因位置,**B 正确**。
③AAbbcc 和④AAbbcc 杂交, F_1 基因型为 AAbbcc,b 基因纯合, F_1 自交后代全部表现为绿色,无法判断基因位置,**C 错误**。
①AABBCC 和③AAbbcc 杂交, F_1 基因型为 AABbCc,仅 B/b 为杂合,C/c 为纯合,无论 B/b 与 C/c 是否连锁, F_1 自交后代均为黄色:绿色=3:1,无法判断基因位置,**D 错误**。

**15 s 速解**

复旦大学 吴添一

判断 B/b 与 C/c 是否连锁,需要 F_1 基因型为 AABbCc (A/a 基因纯合,B/b、C/c 基因杂合),观察选项组合,只有②×③的 F_1 符合要求,可直接判断 B 正确。

6. C 【解析】 本题考查配子不亲和机制。

玉米是雌雄同株异花植物, $AaGg$ 个体的雌、雄配子均正常可育, 仅存在含基因 G 的卵细胞和含基因 g 的花粉的结合限制, 不影响其作为母本或父本参与杂交, **A 正确**。母本 Gg 产生 G 、 g 卵细胞比例为 $1:1$, 父本 Gg 产生 G 、 g 花粉比例为 $1:1$, 理论上后代基因型及占比为 $\frac{1}{4}GG$ 、 $\frac{1}{2}Gg$ (其中有 $\frac{1}{2}$ 组合为含 G 的卵细胞+含 g 的花粉, 不能得到子代)、 $\frac{1}{4}gg$, 故后代基因型及其比例为 $GG:Gg:gg=1:1:1$, **B 正确**。若 M 导入 G 所在染色体, 育性恢复, $AaGg$ 无论作父本还是母本, 产生的配子均为 AG (带 M)、 Ag 、 aG (带 M)、 ag , 比例为 $1:1:1:1$, 与基因型为 $aagg$ 个体测交, 后代基因型 (表型及占比) 为 $Aagg$ (紫粒, $\frac{1}{4}$)、 $AaGg$ (浅紫粒, $\frac{1}{4}$)、 $aaGg$ (黄粒, $\frac{1}{4}$)、 $aagg$ (黄粒, $\frac{1}{4}$), 即紫粒:浅紫粒:黄粒 = $1:1:2$; 若将 M 导入 g 所在染色体, 育性未恢复, $AaGg$ 作父本, 产生的配子种类为 AG 、 Ag (带 M)、 aG 、 ag (带 M), 比例 $1:1:1:1$, 与基因型为 $aagg$ 个体 (作母本) 测交, 后代基因型 (表型及占比) 为 $AaGg$ (紫粒, $\frac{1}{4}$)、 $Aagg$ (浅紫粒, $\frac{1}{4}$)、 $aaGg$ (黄粒, $\frac{1}{4}$)、 $aagg$ (黄粒, $\frac{1}{4}$), 也会出现紫粒:浅紫粒:黄粒 = $1:1:2$, **C 错误**。若 M 导入 A 所在染色体, G 所在染色体无 M , 育性限制仍存在, 当 $AaGg$ 作为父本测交时, 雄配子可全部参与受精, 后代含 A 的个体均带 M (浅紫粒), 不含 A 的个体为黄粒, 结果为浅紫粒:黄粒 = $1:1$, 当 $AaGg$ 作为母本测交时, G 卵细胞无法与 g 花粉结合, 后代表型及比例仍为浅紫粒:黄粒 = $1:1$, **D 正确**。

7. **B** 【解析】本题考查表观遗传。

由题图可知, F_2 性状分离比不是 $3:1$, 原因是 DNA 甲基化 (属于表观遗传) 调控基因表达, 并非不遵循基因分离定律, **A 错误**; 植株 B Lyc 基因两个 Pst I 酶切位点均甲基化, Pst I 无法切割, $Hind$ III 可以切割植株 B Lyc 基因两端, 片段总长为 $1.5+0.7+0.2=2.4$ (kb), 植株 A 的 P 位点存在甲基化差异 (部分细胞甲基化、部分未甲基化), 双酶彻底酶切会产生 4 种不同条带, **B 正确**; F_1 同时含有植株 A、植株 B 来源的 Lyc 基因, 即有甲基化模式不同的等位基因, 酶切条带类型多于植株 A, 电泳图谱不会与植株 A 完全一致, **C 错误**; 二者表型差异来源于 DNA 甲基化 (表观遗传), 表观遗传不改变基因的碱基序列, 因此二者的 Lyc 基因序列不一定存在差异, **D 错误**。

8. **C** 【解析】本题考查系统树与进化。

该系统树显示陆地脊椎动物起源于共同的原始祖先, 体现了共同由来学说, **A 正确**; 系统树中分化节点越晚, 物种间亲缘关系越近, 鸟类与鳄鱼的分化节点晚于鳄鱼与蛇的分化节点, 因此鸟类与鳄鱼的亲缘关系更近, **B 正确**; 由系统树可知, 哺乳类的分化时间早于蜥蜴类, 因此哺乳类化石首次出现的地层应更古老, 即地层年龄更大, **C 错误**; 构建生物系统树可结合比较解剖学的同源器官证据、分子生物学的核酸或蛋白质序列证据等, **D 正确**。

9. **C** 【解析】本题考查甲状腺激素的合成与分泌。

甲状腺激素是氨基酸衍生物 (常考: 甲状腺激素和肾上腺素的化学本质都是氨基酸衍生物), 化学本质不是蛋白质, 但其



合成依赖甲状腺球蛋白(TG),TG是蛋白质,合成时需要核糖体,因此甲状腺激素合成过程需要核糖体参与,**A 正确**;NIS是钠碘同向转运体, I^- 通过NIS的主动运输依赖 Na^+ 的浓度梯度,**B 正确**;TG是大分子蛋白质,分泌TG的过程属于胞吐,胞吐过程需要膜蛋白参与、消耗能量, T_3 、 T_4 的转运过程也需要蛋白质协助,**C 错误**;由题图可知,溶酶体参与甲状腺球蛋白的水解,使TG释放 T_3 和 T_4 ,若溶酶体酶活性异常, T_3 、 T_4 释放减少,会导致甲状腺激素分泌不足,可能引发甲状腺功能衰退,**D 正确**。

10. **D** 【解析】本题考查免疫系统的组成及功能、免疫学的应用。

抗体、细胞因子、溶菌酶都属于免疫活性物质,TSA、TAA属于抗原,不属于免疫活性物质,**A 错误**;同一TSA可存在于不同个体的同一组织类型的肿瘤中,因此,针对TSA的记忆细胞移植给同种小鼠后会使小鼠获得抗肿瘤能力,**B 错误**;免疫系统能够识别“自己”,排除“非己”,TAA既存在于肿瘤细胞表面,也存在于正常细胞表面,TSA仅存在于某种肿瘤细胞表面而不存在于正常细胞,因此,仅含有TAA的肿瘤比仅含有TSA的肿瘤更易躲避免疫系统监视,**C 错误**;因为基因突变具有不定向性,同一物理方法诱变形成的肿瘤抗原具有明显差异性,**D 正确**。

11. **C** 【解析】本题考查光敏色素。

莴苣种子通常需要接受一定时间的红光照射才能萌发,根据题干信息,在红光下, P_R 变为 P_{FR} ,而在远红光下, P_{FR} 变为 P_R , P_{FR} 的形成需要红光来激发, P_{FR} 可影响莴苣种子的萌发,**A 正确**;光敏色素是能够接收光信号的一类蛋白质(色素—蛋白复合体),在受到光照射时,光敏色素的结构会发生变化,这一变化的信息会经过信息传递系统传导至细胞核内,影响特定基因的表达,从而表现出生物学效应,**B、D 正确**;短日照植物所处环境的夜越长(昼越短), P_{FR} 转变为 P_R 就越多,剩下的 P_{FR} 也就越少,有利于短日照植物开花,若夜间给短日照植物补充红光照射, P_R 变为 P_{FR} , P_R 含量减少, P_{FR} 含量增多,不利于短日照植物开花,**C 错误**。

12. **C** 【解析】本题考查群落概念与结构。

玉米幼苗期,通过食草动物的取食除草,会使玉米幼苗被践踏或啃食,无法有效保护玉米幼苗,**A 错误**;玉米地是人工群落,其水平结构简单主要是人为干预导致的,**B 错误**;昆虫的分布取决于食物、栖息场所等,即昆虫在玉米地不同位置的分布格局与其所需资源配置有关,**C 正确**;新杂草迁入后该玉米地的优势种仍为玉米,未发生优势种更替,未发生群落演替(要点:群落演替的本质是群落中优势种的改变),**D 错误**。

13. **A** 【解析】本题考查生态修复。

鱼粪中的有机物经微生物降解后产生的无机物可被蔬菜利用,但能量不能被蔬菜利用,**A 错误**;该系统提高了能量的利用率,减少了化肥和农药的使用,减轻了对环境的污染,**B 正确**;种植床中的微生物能够促进有机物的分解和循环,降解污染物,改善水体质量,在维持该系统高效的物质循环中起重要作用,**C 正确**;该系统通过生物之间相互作用进行自组织,实现系统结构与功能协调,形成可以自我维持的有序的整体,**D 正确**。


14. **B**



题目解读

①去除细胞壁获取原生质体，混合酶液中含有纤维素酶和果胶酶等

②③人工诱导原生质体融合以及再生出新细胞壁的过程




【解析】本题考查植物体细胞杂交。

植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶，去除细胞壁获得原生质体常用纤维素酶和果胶酶处理，所以过程①使用的混合酶液中有纤维素酶和果胶酶，**A 正确**；过程②应在等渗溶液或略高渗溶液中进行，以防止原生质体吸水涨破，**B 错误**；过程④是脱分化，过程⑤是再分化及个体发育，在这两个过程中，培养基中使用的植物激素浓度和比例不同，从而诱导不同的过程（常考：生长素浓度和细胞分裂素浓度之比的比值高时，有利于根的分化；该比值低时，有利于芽的分化；该比值适中时，有利于促进愈伤组织的形成），**C 正确**；植物甲和植物乙的染色体组成不同，理论上杂种植株丙应含有甲和乙的全部染色体，所以可通过分析植物丙的染色体，来鉴定其是不是杂种植株，**D 正确**。

15. **D**

题目解读

引物延伸的方向是 $5' \rightarrow 3'$ ，故只能选择引物2和3



注： Amp^R 表示氨苄青霉素抗性基因，GFP表示绿色荧光蛋白基因。

【解析】本题考查植物细胞培养及基因工程。

次生代谢物一般不是植物基本生命活动所必需的物质，**A 错误**；红豆杉细胞悬浮培养利用了细胞增殖的原理，未体现植物细胞的全能性，**B 错误**；DNA 聚合酶只能从引物的 $3'$ 端延伸子链，据题图可知，PCR 扩增 *Bap1* 基因时应选用引物 2 和 3，构建基因表达载体时，选用 *EcoR* I 和 *Sac* I 会导致 *GFP* 基因被切除，不利于后续筛选，故宜选 *EcoR* I 和 *BamH* I，**C 错误**；基因表达载体中含有 Amp^R ，在添加氨苄青霉素的培养基上，未导入质粒的农杆菌因不具有抗性而无法存活，导入质粒（包括重组质粒和空质粒）的农杆菌能够存活，从而可初步筛选出导入了重组质粒的农杆菌，**D 正确**。

正确。

16. **AD** 【解析】本题考查细胞呼吸。

由题干可知,在低温条件下,黄瓜幼苗的耗氧量增加,说明细胞呼吸增强,葡萄糖的消耗量也会增加,**A 错误**;根据题干可知,低温条件下,黄瓜幼苗耗氧量增加,说明经细胞呼吸使得线粒体内膜两侧 H^+ 的浓度梯度差增加,但 ATP 的合成量却较低,说明 H^+ 可以不通过线粒体 ATP 合酶复合体进入线粒体基质,**B 正确**;低温条件下耗氧量高,而 ATP 合成量低,可能是 H^+ 通过其他方式进入线粒体基质,产生的能量以热能形式释放较多,以此来适应低温环境,**C 正确**;根据前两项的分析可知,线粒体的 ATP 合酶不是 H^+ 进入线粒体基质所必需的,所以低温条件完全抑制 ATP 合酶的活性后,黄瓜的细胞呼吸仍会消耗氧气,**D 错误**。

17. **AD** 【解析】本题考查伴性遗传。

由题图可知,表型正常须同时具有 A 和 D 基因。已知 I_1 的基因型为 $X^{Ad}Y$,而她的女儿 II_2 正常,因为 I_1 的 X^{Ad} 基因一定会传给女儿(II_2),故 II_2 的基因型应为 $X^{Ad}X^{-D}$;由于 II_2 的 X^{-D} 基因来自其母亲(I_2)且 I_2 患病,则来自 I_2 的基因应为 X^{aD} ,由此推测 I_2 的基因型可能为 $X^{aD}X^{aD}$ 或 $X^{aD}X^{Ad}$,**A 正确**。 $I_1(X^{Ad}Y)$ 与 $I_2(X^{aD}X^{aD}$ 或 $X^{aD}X^{Ad})$ 育有正常孩子 II_2 且基因型为 $X^{Ad}X^{aD}$,两条 X 染色体上基因不同; II_3 患病,故 II_3 的基因型为 $X^{aD}Y$ 或 $X^{Ad}Y$, III_3 正常, III_3 的基因型应为 $X^{AD}Y$,由此推测 II_4 的基因型应为 $X^{AD}X^{-}$, II_4 两条 X 染色体上基因可能相同也可能不同,**B 错误**。 II_2 的基因型为 $X^{Ad}X^{aD}$, II_1 表现正常,其基因型为 $X^{AD}Y$,故 III_1 的基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^{AD}X^{Ad}$ 、 $\frac{1}{2}X^{AD}X^{aD}$,由此推测 IV_1 的基因型及概率应为 $\frac{1}{2}X^{Ad}Y$ 、 $\frac{1}{2}X^{aD}Y$,逆推得到 IV_1 的致病基因 X^{Ad} 或 X^{aD} 可能来自 I_1 或 I_2 ,**C 错误**。 III_1 的基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^{AD}X^{Ad}$ 、 $\frac{1}{2}X^{AD}X^{aD}$, III_2 的基因型为 $X^{AD}Y$, III_1 与 III_2 再生一个男孩患病($X^{Ad}Y$ 、 $X^{aD}Y$)的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (关键:男孩患病,已确定性别,只需列出对应患病情况),**D 正确**。

18. **ABD** 【解析】本题考查植物激素。

植物激素调节植物生长发育的本质就是通过调控基因的表达进而影响细胞的生命活动,因此 ABA 和乙烯都可通过影响基因表达调节植物的生长发育,**A 正确**;干旱胁迫下,ABA 含量升高促进抗氧化物体系对 ROS 含量上升的抑制作用,ROS 被抑制后,ROS 诱导产生的乙烯减少,因此 ABA 可以通过限制乙烯产生,解除乙烯对根生长的抑制,调节根的生长,**B 正确**;ABA 促进根生长,提高植物抗旱能力,ROS 抑制根生长,降低植物抗旱能力,二者作用效果相反,**C 错误**;由题图可知 ROS 积累会引发脂质过氧化作用,细胞膜的主要成分是磷脂(脂质),脂质过氧化会损伤细胞膜,最终导致细胞衰老、死亡,**D 正确**。

19. **A** 【解析】本题考查种群的数量变化。

分析题图可知,当种群数量小于 a 或大于 c 时,出生率低于死亡率,种群数量会下降,**A 正确**;种群单位时间内增加的个体数为种群增长速率,当种群数量在 $a \sim c$ 时,出生率高于



死亡率,种群数量不断增加,但种群的增长速率会先增加后下降,**B 错误**;据题图分析可知, b 点时种群的出生率最高,而种群数量为 $\frac{K}{2}$ 时出生率与死亡率的差值应该是最大的,图中出生率与死亡率差值最大的点在 b 点之前,**C 错误**;为持续获得较大捕获量,应使捕捞后种群数量维持在 $\frac{K}{2}$ 左右(种群增长速率最大),从图中可知该种群的 K 值为 c ,所以为持续获得较大捕获量,当年最大捕捞量应为 $\frac{c}{2}$,**D 错误**。

20. AD 【解析】 本题考查传统发酵技术。

将大豆蒸熟可使大豆中的蛋白质变性,有利于后续蛋白酶的分解作用,**A 错误**;小麦粉主要成分是淀粉,属于糖类,糖类可为微生物发酵提供碳源和能源,**B 正确**;大豆中含有较多的蛋白质及脂肪,制曲过程微生物产生较多的蛋白酶和脂肪酶,将有机物分解成小分子后进行生长繁殖,**C 正确**;发酵过程加入食盐水的目的有两个,一是食盐水可调味,二是高浓度食盐水能抑制杂菌的生长繁殖,防止产品腐败变质,**D 错误**。



提分小卷 ▶ 3

1. **B** 【解析】本题考查细胞的基本特征。

细胞壁具有全透性,无法控制物质进出细胞,不能作为系统的边界(易错:细胞的边界是细胞膜),**A 错误**;真核细胞的细胞质中一般含有线粒体、内质网、高尔基体等细胞器,不同细胞器功能各有分工,但在分泌蛋白合成和分泌等生命活动中又相互配合完成生理功能,**B 正确**;细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,但细胞代谢的中心是细胞质,**C 错误**;细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统,三者成分和基本结构上相似,并非完全相同,不同膜的蛋白质种类、含量及糖类含量等存在一定差异,**D 错误**。

2. **D** 【解析】本题考查生物学研究方法。


孟德尔通过豌豆杂交实验的性状统计,间接推断遗传因子的分离定律和自由组合定律,**A 正确**;萨顿通过观察蝗虫减数分裂中染色体行为,推断出基因位于染色体上,**B 正确**;卡尔文利用同位素标记法追踪 ^{14}C 在光合作用中的转移路径,通过检测含放射性标记的化合物,间接推断出 CO_2 转化为有机物的暗反应过程(卡尔文循环),**C 正确**;施莱登通过直接观察花粉、胚珠和柱头,得出“植物体都是由细胞构成的”,属于直接观察而非间接推断,**D 错误**。

易错总结

同位素中, ^{14}C 、 ^3H 、 ^{35}S 、 ^{32}P 是放射性同位素,可通过检测放射性强弱进行追踪; ^{18}O 、 ^{15}N 属于稳定同位素,可通过检测质量或者密度进行分析。

3. **D**

题目解读




【解析】本题考查线粒体的结构。

胰蛋白酶常用来分解动物组织细胞间的蛋白质,使细胞分散开来,不能用胰蛋白酶替代毛地黄苷或 lubrol,**A 错误**;离心过程 I 中的线粒体质量大于离心过程 III 的膜②,因此离心过程 I 需要更低的转速,**B 错误**;膜①为线粒体内膜,其上的酶可催化 NADH 的氧化(易错:NADPH 是在光合作用过程中形成的还原型辅酶II,NADH 是在呼吸作用过程中形成的还原型辅酶I),同时生成大量的 ATP,**C 错误**;酵母菌进行有氧呼吸时,催化 CO_2 生成的酶位于线粒体基质,线粒体基质包括内膜和线粒体基质,上清液②为线粒体基质,**D 正确**。



4. B

题目解读



【解析】本题考查成熟红细胞气体交换。

哺乳动物成熟红细胞无线粒体，不能进行有氧呼吸(注意：哺乳动物成熟红细胞无细胞核和细胞器)，A 错误； CO_2 是调节呼吸运动的主要化学信号，其在人体中积累会刺激呼吸中枢，导致呼吸加深加快，B 正确；糖蛋白位于细胞膜上，不属于内环境的成分，C 错误；渗透压主要与无机盐和蛋白质的含量有关，细胞外液的渗透压 90% 以上来自 Na^+ 和 Cl^- ，D 错误。

易错总结

属于内环境成分的有：机体从消化道吸收的营养物质；细胞产生的代谢废物，如尿素等；细胞分泌的物质，如激素等；氧气、二氧化碳等。

5. B 【解析】本题考查细胞分化与细胞凋亡。

细胞分化具有持久性、稳定性、一般不可逆的特点，未能正常分化的细胞出现异常，并不能说明细胞分化过程可逆，A 错误；胚胎发育过程中，细胞分化可形成不同类型的细胞，进而构建各类组织器官，细胞凋亡可清除发育过程中的异常细胞，二者共同维持胚胎的正常发育，B 正确；细胞凋亡是由基因决定的程序性死亡，若胚胎发育过程中受到极端物理、化学等不利外界因素的损伤，也会发生细胞坏死，C 错误；细胞凋亡贯穿于个体发育的整个生命历程，成年个体中衰老细胞的清除等过程都依赖细胞凋亡，细胞凋亡并非仅在胚胎发育阶段发挥作用，D 错误。

6. C

题目解读

根据题意，Y 染色体含有雄性决定因子，W 染色体能抑制该因子的作用，因此雄性个体的性染色体组成为 XY 或 YY，由于雄性个体不可能产生含 W 的精子，因此雌雄个体交配，后代雌性个体性染色体组成有 WY、WX 或 XX 三种，不可能产生性染色体组成为 WW 的个体，C 错误。

【解析】本题考查性别决定。

性染色体组成为 WY 的个体与雄性个体(XY 或 YY)交配，其后代性染色体组成为 WX、WY、XY、YY 或 WY、YY，雌雄比均为 1:1，A 正确；性染色体组成为 WX 和 XY 的个体交配，后代性染色体组成(性别)为 WX(雌性)、WY(雌性)、XX(雌性)和 XY(雄性)，雌雄比为 3:1，B 正确；性染色体组成为 XX 与 YY 的个体交配，后代性染色体组成均为 XY，均为雄性，可以用于雄性后代的大量繁育，D 正确。

7. D 【解析】本题考查融合蛋白定位。

细胞中出现红色荧光，说明融合基因已翻译出红色荧光蛋白




(关键: 荧光蛋白是翻译的产物, 转录产生的是 mRNA), **A 错误**; 构建基因表达载体需要限制酶切割和 DNA 连接酶拼接, DNA 聚合酶用于 DNA 复制, 通常不用于基因表达载体构建, **B 错误**; 起始密码子可编码氨基酸, 构建融合基因时, *RFP* 基因中编码起始密码子的序列需保留, **C 错误**; 根据启动子、终止子的位置可知, 融合基因转录方向是从左到右, 子链延伸方向为 $5' \rightarrow 3'$, 故蛋白 A 基因和 *RFP* 基因均以 a 链为模板, **D 正确**。

8. **A** 【解析】本题考查同源染色体交换。

由题图 1 可知, “对等交换” 发生在四分体时期, 会改变非等位基因的组合方式, 并不导致等位基因分离, 等位基因分离主要发生在减数第一次分裂后期, 随同源染色体分开而分离, 这是孟德尔分离定律的基础, **A 错误**; “不对等交换” 导致一条染色体出现重复, 另一条染色体出现缺失, 改变基因数量, 属于染色体结构变异, **B、C 正确**; 两种交换均可能发生在减数第一次分裂前期的四分体时期, 此时非姐妹染色单体间可能发生互换, **D 正确**。

9. **C**

题目解读



【解析】本题考查心率活动调节。

分析题图, 神经元 1 和神经元 2 能促使心跳加快, 属于交感神经, 由相应的脊髓段发出, **A 错误**; ACh 与 N1 受体结合后, 最终引起突触后神经元释放神经递质 NE, 则 ACh 为兴奋性神经递质, 其与 N1 受体结合后引起下一个神经元兴奋, **B 错误**; 结合题图可知, ACh 在某神经细胞上的受体为 N1 受体, 在肾上腺髓质细胞上的受体为 N2 受体, 即同一神经递质在不同细胞上的受体可能不同, **C 正确**; 心率调节过程中, NE 可以由神经细胞释放, 属于神经递质, 也可以由肾上腺髓质细胞分泌, 属于激素, **D 错误**。

10. **B** 【解析】本题考查激素调节。

垂体的功能多而复杂(常考: 垂体接受下丘脑分泌的激素的调节, 从而分泌促甲状腺激素、促性腺激素等, 分别调节相应内分泌腺的分泌活动; 垂体分泌的生长激素能调节生长发育等), 分泌促肾上腺皮质激素是垂体的功能之一, 但不是其主要功能, **A 错误**; 激素经靶细胞接受并起作用后就失活了, **B 正确**; 促肾上腺皮质激素释放激素的受体只存在于垂体, 而肾上腺无该激素的受体, 因此该激素不能直接作用于肾上腺, **C 错误**; 题图中糖皮质激素的分泌存在“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”的分级调节, 促肾上腺皮质激素



释放激素和促肾上腺皮质激素的分泌不存在分级调节，**D 错误**。

易错总结 在下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的这种激素分泌的分层调控，称为分级调节。分级调节表现为一种连续的、逐级控制激素分泌的过程，可以放大激素的调节效应，形成多级反馈调节。

11. C 【解析】 本题考查植物生长调节剂。

植物生长调节剂是人工合成的，有的与相应植物激素的结构相似，有的结构与相应植物激素的差别较大，**A 错误**；由题图 2 可知，200 mg/L 的 6-BA 处理组 (A4 组) 开花所需天数比 100 mg/L 的 6-BA 处理组 (A3 组) 更长，说明不是 6-BA 浓度越高提前的天数越多，**B 错误**；根据题图 1 的结果可知，一定范围内花芽数量与 6-BA 浓度呈正相关，随着 6-BA 的浓度增加，花芽数量增加，而 4 种浓度的 GA3 处理后，花芽数量均少于清水组，说明均抑制花芽形成，**C 正确**；据题图 2 可知，B1、B2、B3 组开花所需天数比 CK 组少，说明一定浓度的 GA3 可使墨兰提前开花，**D 错误**。

12. A 【解析】 本题考查隔离。

甲种群中田鼠均匀分布，无明显地理阻碍，种群内雌雄个体比例接近 1 : 1，即性别比例接近 1 : 1，性别比例一般直接影响出生率，不直接影响死亡率，乙种群被高速公路分割为 4 个小区域，导致种群碎片化，与甲种群相比，乙种群碎片化更明显，**A 正确，C 错误**；据题图可知，乙种群被高速公路分成不同区域，说明已经形成了地理隔离，**B 错误**；自然选择直接作用的对象是表型 (常考：自然选择直接作用的对象是表型，间接作用的对象是基因型)，使④区域雌性个体比例较高，**D 错误**。

13. A 【解析】 本题考查生态足迹与碳中和。

CO₂ 进入生物群落的途径除光合作用外，还包括硝化细菌等微生物的化能合成作用，并非只有光合作用，**A 错误**；湿地保护可有效实现碳中和，从而实现对生态环境的保护，体现了生物多样性的间接价值，**B 正确**；低碳生活和绿色农业减少了 CO₂ 的排放，减少了吸纳废物的土地及水域的面积，从而减小了生态足迹，**C 正确**；一个地区的生态足迹越大，说明维持某一人口单位生存所需要的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积越大，对于资源的利用越多，可持续发展能力通常越弱，**D 正确**。

14. C

题目解读

影印培养法是指在一系列平板培养基的相同位置上接种并培养出相同菌落的一种微生物培养方法。主要操作方法是：用灭菌的丝绒布覆盖在一块与平板同样大小 (或略小) 的木制圆柱体上，轻轻地在原始平板上印一下，使菌落转移到丝绒布上，然后将丝绒布有菌落的一面再印在另外的选择培养基平板上，保持菌落位置一致。培养后，对平板上相同位置出现的菌落进行对比，从而筛选出所需的菌株。

【解析】 本题考查影印法筛选目标菌株。

诱变处理可使菌种发生基因突变，基因突变具有不定向性，**A 错误**；题图中的基本培养基属于选择培养基，但不属于鉴别培养基，**B 错误**；为避免完全培养基中的氨基酸等营养物



质污染丝绒布,进行过程②的操作时,应先将丝绒布转印至基本培养基上,**C 正确**;根据培养基上的菌落分布可知,菌落 B 在基本培养基(即选择培养基)和完全培养基中均有生长,菌落 A 不能在基本培养基(即选择培养基)中生长而能在完全培养基中生长,因此可推知菌落 A 中有氨基酸 S 缺陷型菌,**D 错误**。

15. A

题目解读

据题图可知,融合 PCR 的大致过程是利用引物 P1、P2 对基因甲进行扩增,同时,在另一 PCR 体系中,利用引物 P3、P4 对基因乙进行扩增,再根据基因甲和乙中各有一条链之间存在部分碱基互补配对,两条链重叠部位可互相作为另一条链延伸的引物,继而合成融合基因。整个过程的关键是引物 P2、P3 的设计,二者的部分序列碱基互补配对,能将基因甲和基因乙通过部分引物序列的配对融合起来;也正因如此,不可将四种引物同时加入一个扩增体系,否则会因引物 P2、P3 之间存在互补序列导致融合基因扩增失败。

【解析】本题考查 PCR 技术原理。

引物 P1 与基因甲的一端结合,第二轮循环时,引物 P1 与含引物 P2 的子链结合,延伸后可得到含引物 P2 的双链等长 DNA,**A 错误**;由题目解读可知,**B 正确**;结合题图可知,融合 PCR 的第一步中两条链重叠部位互补配对,可互为另一条链延伸的引物,**C 正确**;若融合 PCR 第二步获得了 64 个融合基因,引物数目和新合成的子链数目相同,即该过程消耗引物 P1 和 P4 共 $64 \times 2 - 2 = 126$ (个),即消耗 $126 \div 2 = 63$ (个)引物 P4,**D 正确**。

16. ABD 【解析】本题考查细胞呼吸。

正常通气条件下,两个油菜品种根部细胞中均检测到乙醇,乙醇是植物细胞无氧呼吸的产物,说明此时根部细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,**A 正确**;乙醇对植物根部细胞有毒害作用,低氧条件下 B 品种根部乙醇含量远低于 A 品种,说明 B 品种低氧胁迫下受毒害作用更小,对低氧胁迫的耐受力更强,**B 正确**;丙酮酸与水的反应属于有氧呼吸第二阶段,发生在线粒体基质中,低氧条件下有氧呼吸受抑制,更多丙酮酸用于无氧呼吸生成乙醇,进入线粒体参与该反应的丙酮酸减少,因此低氧会影响该反应的进行,**C 错误**;低氧条件下油菜根细胞主要进行无氧呼吸,葡萄糖分解不彻底,葡萄糖分子中的大部分能量储存在氧化产物酒精(乙醇)中,仅释放少量能量,**D 正确**。



30 s 速解

中国科学技术大学 王炯涵

学霸说:呼吸作用图像题先找“诊断性产物”——乙醇出现说明进行了无氧呼吸。判断抗逆品种时,不看某个数值单独的高低,而看低氧胁迫后代谢受干扰程度和维持供能的能力。

正常通气组仍检测到乙醇,说明根细胞并非只进行有氧呼吸,A 成立;低氧下 B 品种乙醇含量较少,受胁迫程度较小,B 成立;低氧会抑制线粒体中的有氧呼吸过程,C 不成立;无氧呼吸释放的能量很少,葡萄糖中的大部分能量储存在乙醇里,D 成立。先认产物,再比变化,最后看能量。

**17. ABD 【解析】**本题考查人类遗传病与水盐平衡调节。

双亲正常却生育出患病儿子,说明该病为隐性遗传病(无中生有为隐性),已知 I-1 不带致病基因,若为常染色体隐性遗传,患病儿子的一个致病基因需来自父亲 I-1,与“ I-1 不携带致病基因”矛盾,因此该病为伴 X 染色体隐性遗传病, **A 错误**;该病为伴 X 染色体隐性遗传病,设该病相关基因为 A/a, I-2 生育了两个患病儿子, I-2 一定是携带者 ($X^A X^a$), III-2 为 I-1 与 I-2 的外孙女,其母亲 II-5 基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^A X^A$ 、 $\frac{1}{2}X^A X^a$, 父亲 II-6 基因型为 $X^A Y$, 故 III-2 基因型为 $X^A X^a$ 的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 即 III-2 与 I-2 基因型相同的概率为 $\frac{1}{4}$, **B 错误**;该病是抗利尿激素分泌不足导致的,抗利尿激素能促进肾小管、集合管重吸收水,该激素分泌不足时水重吸收减少,会出现多尿症状,机体失水后细胞外液渗透压升高,会出现易渴、多饮的症状, **C 正确**;抗利尿激素的化学本质是多肽,口服后会被消化道中的消化酶分解,无法发挥作用, **D 错误**。

18. C 【解析】本题考查免疫调节。

B 细胞抗原受体 (BCR) 是分布在 B 细胞膜上可特异性识别抗原的受体,记忆 B 细胞也能识别相应抗原,所以推测记忆 B 细胞表面也具有 BCR, **A 正确**;抗原呈递细胞可以摄取病原体,将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性 T 细胞,辅助性 T 细胞表面的特定分子发生变化并与 B 细胞结合,这是激活 B 细胞的第二个信号,所以 B 细胞可以接受辅助性 T 细胞表面特定分子提供的信号, **B 正确**;B 细胞表面的 BCR 与其分化为浆细胞后产生的抗体识别相同的抗原, **C 错误**;B 细胞抗原受体 (BCR) 能特异性与抗原结合,不同 B 细胞膜上的 BCR 可能不同,通常一种 BCR 只能识别一种抗原, **D 正确**。

19. ACD 【解析】本题考查种群的数量变化。

图 1 中 R 值 >1 时,种群数量在增加,所以 b 点的种群数量大于 a 点。虽然 a 点和 b 点的 R 值相同,但无法判断两点的出生率和死亡率的数值大小,故无法确定 a 点和 b 点种群增长率的大小关系, **A 错误**;图 2 中, λ 值 >1 时,种群数量增加, b' 点种群数量是大于 a' 点的,两点的 λ 值相同,种群增长率 $= \lambda - 1$, 所以两点的种群增长率相同, **B 正确**; a 点和 b 点的种群增长率大小无法确定, a' 点和 b' 点的种群增长率相同,若 a 点种群增长率等于 a' 点, b 点和 b' 点种群增长率大小仍无法确定,同理,若 a 点种群增长速率等于 a' 点, b 点和 b' 点种群增长速率大小也无法确定, **C、D 错误**。

要点归纳

种群增长率 = (某年种群个体的总数量 - 前一年种群个体的总数量) ÷ 前一年种群个体的总数量 $\times 100\% = \lambda - 1 = \text{出生率} - \text{死亡率}$ 。当 $\lambda > 0$ 时,种群数量将增多;当 $\lambda = 0$ 时,种群数量将保持不变;当 $\lambda < 0$ 时,种群数量将减少。



20. ABC

题目解读

题图 1 所示流程为制备人参皂苷 Rg3 的过程,其中①②③分别表示脱分化、细胞增殖、大量培养细胞并提取人参皂苷 Rg3。题图 2 表示生物反应器中人参细胞产量、人参皂苷 Rg3 产量随培养时间的变化,由曲线可知,影响人参皂苷 Rg3 产量的因素有人参细胞数量和培养时间。

【解析】本题考查植物细胞工程。

题图 1 中①表示脱分化,该过程没有体现植物细胞的全能性,整个实验的目的是利用细胞株得到细胞产物,其原理是植物细胞增殖,没有体现植物细胞的全能性,**A 错误**;题图 1 过程②为细胞增殖,不需要用纤维素酶和果胶酶分散细胞,**B 错误**;过程③通常采用振荡培养获得大量组织细胞,振荡培养除有利于增加培养体系溶解氧外,还能防止细胞聚集,**C 错误**;由题图 2 可知,生物反应器中人参细胞的数量和人参皂苷 Rg3 产量增加趋势基本一致,因而可推测,影响人参皂苷 Rg3 产量的因素有人参细胞数量和培养时间,**D 正确**。

提分小卷 ▶ 4

1. **D** 【解析】本题考查高密度脂蛋白。


蛋白质的基本组成元素是 C、H、O、N, 胆固醇的元素组成为 C、H、O 三种, 不含 N 元素, **A 错误**; 核糖体是蛋白质的合成场所, 脂质的合成场所主要为内质网, 并非核糖体, **B 错误**; 脂蛋白属于大分子物质, 细胞分泌大分子物质的方式为胞吐, 主动运输是部分离子和 小分子物质跨膜运输的方式 (**易错: 某些小分子物质跨膜运输的方式可以是胞吐, 如神经递质**), **C 错误**; 胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分, 在人体内也参与血液中脂质的运输, **D 正确**。

2. **B** 【解析】本题考查小胶质细胞。

PRRs 本质为蛋白质, 不同氨基酸的差异在于 R 基, 用 ^3H 标记特定氨基酸的 R 基可避免放射性标记在氨基酸缩合反应过程中丢失, 能有效追踪 PRRs 的合成与运输路径, **A 正确**; PRRs 与靶标的特异性识别体现了细胞膜的信息交流 (识别) 功能, 并未体现细胞膜控制物质进出细胞的功能, **B 错误**; 小胶质细胞吞噬靶标的过程属于胞吞, 依赖细胞膜的流动性, 该过程中细胞膜上的磷脂分子会发生侧向移动, **C 正确**; 溶酶体中含有多种水解酶, 可将吞噬的靶标分解, 分解产生的氨基酸等有用物质可被细胞重新利用, **D 正确**。

3. **D** 【解析】本题考查生物学史经典实验。

将豚鼠胰腺腺泡细胞放入含有 ^3H 标记的亮氨酸的培养液中培养, 利用放射性同位素标记法可以追踪分泌蛋白的合成和分泌路径, **A 不符合题意**; 生长素的发现过程中, 科学家将放置过胚芽鞘尖端的琼脂块放在去除尖端的胚芽鞘一侧, 目的是使胚芽鞘尖端产生的“影响” (生长素) 在去除尖端的胚芽鞘中分布不均匀, 进而证明尖端产生的“影响”确实是一种化学物质, 且其不均匀分布会导致胚芽鞘弯曲生长, 操作如图,



B 不符合题意; 结扎胰管会使胰腺萎缩, 胰蛋白酶无法分泌, 进而避免胰岛素被分解, **C 不符合题意**; 艾弗里的实验中向 S 型细菌的细胞提取物中加入 DNA 酶将 DNA 去除, 目的是研究 DNA 是不是使肺炎链球菌转化的关键物质, 而不是观察蛋白质对肺炎链球菌转化的影响, **D 符合题意**。

4. **A** 【解析】本题考查糖酵解。

当细胞内 ATP 与 ADP 比值升高时, 说明细胞中 ATP 含量充足, 不需要再通过糖酵解合成 ATP, 为避免物质和能量浪费, 会抑制酶甲、丙的活性, **A 错误**; 由题图可知, 1 分子葡萄糖在糖酵解前期共消耗 2 分子 ATP, 糖酵解为细胞呼吸的第一阶段, 整个过程最终会产生 ATP, 故糖酵解过程中既有 ATP 的消耗, 也有 ATP 的生成, 且生成量大于消耗量, **B 正确**; 葡萄糖的磷酸化使葡萄糖的空间构象发生改变, 更易与后续反应的酶结合, 有利于后续反应的进行, **C 正确**; 糖酵解是细胞呼吸的第一阶段, 场所为细胞质基质, 该过程中除生成丙酮酸、少量 ATP 外, 还会生成还原型辅酶 I (NADH), **D 正确**。

5. **B** 【解析】本题考查减数分裂过程。

先判断题图中各细胞所处时期: ①为减数第一次分裂中期, ②为减数第二次分裂前期, ③为减数第一次分裂前期, ④为



减数第一次分裂后期,⑤为减数第二次分裂末期,故细胞出现的顺序为③→①→④→②→⑤, **A 正确**; ③处于减数第一次分裂前期,同源染色体的非姐妹染色单体会发生互换,该变异属于基因重组,不是染色体变异, **B 错误**; ④处于减数第一次分裂后期,着丝粒未分裂,因此该细胞中含有 24 条染色体,每条染色体含 2 条染色单体,含 2 个核 DNA,即共含有 48 个核 DNA 和 48 条染色单体, **C 正确**; ①处于减数第一次分裂中期,细胞中染色体数为 24,⑤产生的子细胞即减数分裂结束产生的子细胞中染色体数为 12,是①中染色体数目的一半, **D 正确**。

6. D 【解析】本题考查 DNA 的结构。

根据碱基互补配对原则, A(腺嘌呤)与 T(胸腺嘧啶)配对, G(鸟嘌呤)与 C(胞嘧啶)配对, 因此①为胸腺嘧啶, ②为胞嘧啶, **A 错误**; ③是脱氧核糖, 线性双链 DNA 的每条链 3' 端的脱氧核糖仅连接 1 个磷酸基团, **B 错误**; ④是氢键, 氢键断裂可通过解旋酶或高温实现, 氢键形成一般不需要酶催化, **C 错误**; 双链 DNA 分子遵循碱基互补配对原则, 嘌呤碱基总数(A+G)等于嘧啶碱基总数(T+C), 因此二者的比例相同, **D 正确**。

7. B 【解析】本题考查果蝇翅型的遗传。

依据题干信息, 一对纯种的长翅果蝇与残翅果蝇杂交, F_1 中长翅全为雌蝇, 小翅全为雄蝇, 翅型存在性别差异, F_2 雌、雄果蝇中均出现长翅: 小翅: 残翅 = 3: 3: 2 的分离比, 为 9: 3: 3: 1 的变式, 所以可推知, 翅型受独立遗传的两对等位基因的控制, 且其中一对等位基因位于 X 染色体上, 另一对等位基因位于常染色体上, **A 正确**。结合 A 项解析, 设控制翅型的一对等位基因 A/a 位于常染色体上, 另一对等位基因 B/b 位于 X 染色体上, 现假设亲本中长翅果蝇为雌性, 基因型为 AAX^BX^B , 残翅果蝇为雄性, 基因型为 aaX^bY , 则 F_1 的基因型为 AaX^BX^b 、 AaX^BY , 均为双显性个体, 表型应均为长翅, 故假设错误; 假设亲本中长翅果蝇为雄性, 基因型为 AAX^BY , 残翅果蝇为雌性, 基因型为 aaX^bX^b , F_1 的基因型(表型)为 AaX^BX^b (长翅雌性)、 AaX^bY (小翅雄性), 与题述信息相符, 故亲本中长翅果蝇为雄性, 残翅果蝇为雌性, **B 错误**。结合 B 项解析可推知, F_2 中长翅果蝇的基因型有 4 种, 分别是 AAX^BX^b 、 AaX^BX^b 、 AAX^BY 、 AaX^BY ; 小翅果蝇的基因型有 4 种, 分别是 AAX^bX^b 、 AaX^bX^b 、 AAX^bY 、 AaX^bY ; 残翅果蝇的基因型有 4 种, 分别为 aaX^BX^b 、 aaX^bX^b 、 aaX^BY 、 aaX^bY , **C 正确**。结合 B、C 项解析, 若选取基因型为 aaX^BY 的纯种残翅果蝇和基因型为 AAX^bX^b 的纯种小翅果蝇杂交, 则子代中雌蝇的基因型(表型)均为 AaX^BX^b (长翅), 雄蝇的基因型(表型)均为 AaX^bY (小翅), 与 F_1 的结果相同, **D 正确**。

8. B

题目解读

分析题图 1: 途径 1 是利用基因重组的原理, 通过杂交育种的方法获得品种 A; 途径 2 是利用染色体变异的原理, 通过单倍体育种的方式获得品种 B; 途径 3 是将体细胞进行植物组织培养后再用秋水仙素处理获得四倍体植株(品种 C), 属于多倍体育种; 途径 4 是利用基因突变的原理, 进行诱变育种获得品种 D。

【解析】本题考查基因突变与育种。

途径 3 是利用植物组织培养技术将叶肉细胞培养为幼苗后, 再用秋水仙素处理获得四倍体植株, 属于多倍体育种, 其原



理为染色体数目变异,多倍体植株一般茎秆粗壮、果实较大、营养物质含量增加,**A 错误**;途径 2 中用秋水仙素处理花粉粒离体培养获得的幼苗,秋水仙素能抑制纺锤体的形成,使得染色体数目加倍,从而获得纯合的二倍体植株,这种方法可以快速获取纯合的品种 B,**B 正确**;据题图 2 可知,途径 4 中 r 基因突变为 R 基因时,②处及之后氨基酸的序列都发生了改变,导致②处突变的原因可能是发生了碱基对的增添或者缺失,**C 错误**;据题图 1 可知,途径 1 是利用基因重组的原理,通过杂交育种的方法获得品种 A,基因型为 hhrr 的个体是隐性纯合个体,可以直接从 HhRr 个体的自交后代中筛选出来,**D 错误**。

9. D 【解析】本题考查胰岛 B 细胞的损伤与修复。

本实验的目的是探究巴瑞替尼对胰岛 B 细胞的修复效果,实验的前提是构建胰岛 B 细胞损伤的模型鼠。已知长期高糖高脂环境会损伤胰岛 B 细胞,所以可通过持续给予高糖高脂饮食以获得模型鼠,**A 正确**。据题意可知,高糖高脂环境造成的胰岛 B 细胞损伤,在恢复正常饮食后仍会持续进展一段时间,对照组不用药,因此 4 周后对照组胰岛 B 细胞损伤随病程进展加重,胰岛素分泌进一步减少,**B 正确**。实验设计需要遵循对照原则和单一变量原则,探究药物的作用时,对照组通常使用等量不含药物的溶剂处理,所以对照组处理是模型鼠口服等量生理盐水,**C 正确**。①是实验前(未给药处理)的正常鼠胰岛素水平,②是实验 4 周后的实验组结果,①②对照只能说明给药后实验组胰岛素水平仍低于实验前,无法说明巴瑞替尼的修复作用;要证明巴瑞替尼有修复效果,需要②(实验组)和③(对照组)对照,②胰岛素含量显著高于③,说明巴瑞替尼具有一定的修复作用,**D 错误**。



30 s 速解

中国科学技术大学 王炯涵

①是实验前正常小鼠胰岛素含量变化情况,②是给药后模型鼠胰岛素含量变化情况。要证明药物效果需②与③对比,而非①②对比,可直接判断出 D 错误。

10. B 【解析】本题考查调节性 T 细胞的功能。

浆细胞能产生抗体,调节性 T 细胞不能产生抗体,**A 错误**。调节性 T 细胞属于 T 细胞,T 细胞起源于骨髓的造血干细胞,在胸腺中发育成熟,**B 正确**。调节性 T 细胞具有免疫抑制作用,若其功能缺失,机体免疫功能可能过强,免疫系统可能会攻击自身正常组织,引发自身免疫病;免疫缺陷病是指由机体免疫功能不足或缺乏导致的疾病,二者不同,**C 错误**。调节性 T 细胞具有免疫抑制作用,增强其活性会抑制免疫系统对癌细胞的清除,治疗癌症应适当降低调节性 T 细胞的活性,**D 错误**。

知识拓展

免疫调节与疾病治疗

调节性 T 细胞(Treg 细胞)是维持免疫耐受的关键细胞,其功能异常与多种疾病相关:

(1) 功能过强→免疫抑制→肿瘤细胞免疫逃逸→癌症发生风险增加。

(2) 功能缺失→免疫功能可能过强→自身免疫病(如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等)。



因此,癌症免疫治疗的思路之一是降低 Treg 细胞活性以解除免疫抑制,而治疗自身免疫病则需增强 Treg 细胞功能以恢复免疫耐受。

11. **B** 【解析】本题考查生长素作用机制。

生长素作为植物激素,具有调节作用,无催化作用,其与细胞膜上的 H^+ 转运蛋白结合后促进 H^+ 运输,该过程需要消耗 ATP,属于主动运输,**A 错误**;结合题图可以看出,细胞壁 pH 下降的直接原因是细胞质中的 H^+ 的主动运输, H^+ 松解纤维素,有利于细胞纵向生长,**B 正确**;生长素作为植物激素,不仅可以促进细胞伸长生长,还可以促进细胞分化和细胞核分裂,**C 错误**;细胞最终伸长不仅依赖细胞壁松弛,还需要细胞吸水等条件,**D 错误**。

12. **B** 【解析】本题考查生物的种间关系。

雌性草地贪夜蛾对健康玉米或机械损伤玉米的选择偏好率无显著差异,说明机械损伤的玉米产生的挥发物对草地贪夜蛾没有显著吸引作用,**A 错误**;不管是和健康玉米相比,还是和机械损伤玉米相比,雌性草地贪夜蛾都更少选择幼虫侵染玉米,说明玉米被幼虫侵染后产生的挥发物可以驱避草地贪夜蛾,**B 正确**;互利共生是两种生物长期相互依存、彼此有利的共生关系,题述实验结果只能说明赤眼蜂可能会被草地贪夜蛾幼虫侵染玉米的挥发物吸引,无法说明赤眼蜂和玉米之间的关系,**C 错误**;利用植物自身的挥发物(信息物质)调控害虫的行为,属于生物防治,化学防治指利用化学药物等进行防治,**D 错误**。

13. **D**

题目解读

本题考查能量流动过程中摄入量、同化量的去向,摄入量=同化量+粪便量,同化量=通过呼吸作用以热能形式散失的能量+用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量,用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量的去向有流入下一营养级、被分解者分解和未利用。相邻两个营养级间的能量传递效率=某营养级的同化量÷上一营养级的同化量 $\times 100\%$ 。

【解析】本题考查生态系统的能量流动。

未被利用的能量是指未被自身呼吸作用消耗,也未被下一个营养级或分解者利用的能量,呼吸代谢能是绵羊呼吸作用散失的能量,是绵羊同化量的一部分,**A 错误**。绵羊粪便中的能量不属于绵羊的同化量,而属于其上一营养级的同化量,因此绵羊粪便中的能量不是绵羊流向分解者的能量,**B 错误**。摄入量-粪便量=同化量,同化量-呼吸作用散失的能量=用于生长、发育和繁殖的能量,因此由题表信息可知,平均载畜量为 1.3 时,绵羊用于生长、发育和繁殖的能量约为 $(3.22 - 0.95 - 1.86) \times 10^4 = 0.41 \times 10^4$ (千焦 $\cdot$ 只羊 $^{-1}\cdot$ 天 $^{-1}$),**C 错误**。根据题表信息可知,平均载畜量为 2.0 时,动物的同化量 $\div$ 草原植物供给能 $\times 100\% = (2.62 - 0.92) \div 5.28 \times 100\% \approx 32.2\%$;平均载畜量为 3.0 时,动物的同化量 $\div$ 草原植物供给能 $\times 100\% = (1.86 - 0.94) \div 3.32 \times 100\% \approx 27.7\%$;平均载畜量为 1.3 时,动物的同化量 $\div$ 草原植物供给能 $\times 100\% = (3.22 - 0.95) \div 8.86 \times 100\% \approx 25.6\%$,所以平均载畜量为 2.0 时,短花针茅草原的能量得到更充分的利用,**D 正确**。

14. **A** 【解析】本题考查传统发酵工艺。


面酱制作利用的米曲霉是异养生物,**A 错误**;将面粉蒸熟的

操作利于米曲霉将淀粉分解进行糖化,还可以起到灭菌作用,以免影响所需菌种的生长,**B 正确**;熟料温度降至 40°C 才能制曲,这是为了防止高温杀死菌种,**C 正确**;高压蒸汽灭菌可以彻底杀死微生物,起到延长产品的保存期的作用,**D 正确**。

15. **D**

题目解读

第一次转化为将重组载体导入农杆菌,第二次转化为农杆菌将 T-DNA 转入水稻细胞, **A 正确**; 步骤 I (农杆菌筛选) 和步骤 III (将水稻愈伤组织培养成幼苗) 均需使用固体培养基, **B 正确**



【解析】本题考查基因工程的基本操作程序。

步骤 I 的筛选 (如农杆菌阳性克隆鉴定) 可通过 PCR 技术检测目的基因是否转入农杆菌 (常考: PCR 技术可用于目的基因和基因表达载体的筛选), **C 正确**; SAMS 基因具有提高抗逆性的作用, 获得的转基因水稻幼苗不一定都具有抗盐碱的能力 (关键: 转基因植株可能存在基因沉默或未正确整合的情况, 从而不能正常表达), 还需要将转基因水稻置于盐碱的环境中进行筛选与鉴定, **D 错误**。

16. **ABD** 【解析】本题考查细胞凋亡。

核仁与 rRNA 的合成以及核糖体的形成有关, 其稳定性下降会导致 rRNA 合成异常, 核糖体组装受阻, 而核糖体是翻译的场所, 因此会影响基因的表达, **A 正确**; 线粒体是有氧呼吸的主要场所, 是细胞的“动力车间”, 线粒体功能失调会使衰老细胞 ATP 合成速率下降, 多数物质的运输需要消耗 ATP, 因此物质运输功能降低, **B 正确**; 发菜是蓝细菌的一种, 属于原核生物, 原核生物仅含有核糖体一种细胞器, 没有线粒体, 不可能出现线粒体膜间隙中的细胞色素 c 等蛋白质释放的情况, **C 错误**; 根据题干信息, 受损线粒体释放细胞色素 c 会引发细胞凋亡, 自噬溶酶体可清除受损线粒体, 因此促进细胞自噬会减少细胞色素 c 的释放, 可以延缓细胞凋亡, **D 正确**。

17. **AD**

题目解读

本题涉及甲病遗传系谱图+基因测序图的综合分析。①系谱图显示甲病为隐性遗传病; ②测序图: I_1 正常杂合子 (正常峰+突变峰), II_2 正常纯合子 (仅正常峰), II_3 突变纯合子 (仅突变峰), 故甲病为常染色体隐性遗传病。

【解析】本题考查人类遗传病。

由题目解读可知, 甲病是常染色体隐性遗传病 (基因型为 aa 的个体患病), 男女发病率相等, **A 错误**。 II_3 患甲病, 基因型为 aa (甲病), 同时患红绿色盲 (X^bY)。体细胞中含两个甲病致病基因和一个红绿色盲致病基因, 精原细胞 DNA 复制后基因型为 $\text{aaaaX}^b\text{X}^b\text{YY}$, 减数第一次分裂后期同源染色

体分离,非同源染色体自由组合:次级精母细胞基因型可能为 aaX^bX^b (2个 a +2个 X^b) 或 $aaYY$ (2个 a),可同时含有4个致病相关基因,**B 正确**。观察题图2测序峰可知,第786位碱基正常为 G , II_3 显示为 A ,所以基因突变是碱基 $G \rightarrow A$ 导致的,**C 正确**。已知人群中甲病致病基因频率为 $\frac{1}{100}$,即 $a = \frac{1}{100}$ 、 $A = \frac{99}{100}$,正常个体中,杂合子概率为 $\left(2 \times \frac{1}{100} \times \frac{99}{100}\right) \div \left(2 \times \frac{1}{100} \times \frac{99}{100} + \frac{99}{100} \times \frac{99}{100}\right) = \frac{2}{101}$,所以 II_1 基因型为 Aa 的概率是 $\frac{2}{101}$,根据测序结果可知 II_2 (正常女性) 基因型为 AA , II_3 还患红绿色盲,则 I_2 相关基因型为 X^BX^b , II_2 相关基因型及概率为 $\frac{1}{2}X^BX^B$ 、 $\frac{1}{2}X^BX^b$, II_1 不患红绿色盲,相关基因型为 X^BY ,则 III_1 同时携带甲病致病基因和红绿色盲致病基因的概率为 $\frac{2}{101} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{404}$,**D 错误**。

18. **ACD** 【解析】本题考查动作电位。

题图1的 g 点是内向电流转为外向电流的关键点,此时钠离子内流达到顶峰,即将开始钾离子外流,对应膜电位为动作电位的峰值;题图2中的 d 点是动作电位的峰值,与题图1中的 g 点的生理过程相对应,**A 正确**。内向电流是钠离子内流,外向电流是钾离子外流。从题图1可以看到,TTX组几乎没有内向电流,说明TTX阻断了钠离子通道,TEA组几乎没有外向电流,说明TEA阻断了钾离子通道,**B 错误**。神经纤维受到刺激后,钠离子通道打开,钠离子大量内流形成内向电流,这是动作电位产生的主要原因,**C 正确**。静息电位的形成主要与钾离子外流有关,胞外钾离子浓度增大后,细胞膜内外钾离子的浓度差减小,钾离子外流的量减少,导致测得静息电位的绝对值减小,**D 正确**。

19. **A** 【解析】本题考查种间关系。

根据题图可知,“同种负密度制约”现象是指与母树的距离近处,种子数量很多,后代存活概率却很低,甚至不能存活,这为其他物种提供了生存空间和资源,故有利于提升热带雨林的物种丰富度,**A 不合理**;母树附近土壤中存在专一性致病菌,可能使同种生物不能存活,导致幼苗死亡率上升,**B 合理**;母树附近幼苗密度过高时,可能会释放化学信息影响幼苗的存活率,使周围的本物种数目减少,**C 合理**;母树附近捕食者对其种子具有较强的取食选择性,可使母树周围本物种种子大量减少,降低种子成为幼苗的概率,**D 合理**。

20. **BD** 【解析】本题考查微生物培养。

由题意可知,金黄色葡萄球菌具有对青霉素的敏感度高和高度耐盐等特性,故在金黄色葡萄球菌的分离培养过程中,须在选择培养基中加入10%~15%的 NaCl ,但不能加青霉素,**A 错误**;金黄色葡萄球菌能产生溶血素,将红细胞溶解,所以培养在血琼脂平板上的金黄色葡萄球菌菌落周围会出现透明的溶血圈,**B 正确**;利用平板划线法不能在固体培养基表面获得均匀分布的金黄色葡萄球菌的单个菌落,应该采用稀释涂布平板法,**C 错误**;可利用PCR等技术检测 *mecA* 基因,从而检测筛选出MRSA,**D 正确**。